


Вариант	Контроль	ФАРАДЕЙ®
Распространение КГ, % (конец кущения)	26,0	4,3
Развитие КГ, % (конец кущения)	11,3	1,1
Густота всходов, шт	202,3	225,6
Вес зерна с одного колоса, г	1,3	2,0
Урожайность, ц/га	20,8	22,7

Сравнение показателей по урожайности при применении **ФАРАДЕЙ®** и без применения препарата.



Биологическая эффективность **ФАРАДЕЙ®** против корневых гнилей яровой пшеницы в период кущение - начало выхода в трубку.



НПЦ им.А.И. Бараева. 2019 год.




Применение **ФАРАДЕЙ®** на зерновых культурах.



НПЦ им.А.И. Бараева. 2019 год



БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ВЫ СМОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ
НА НАШЕМ САЙТЕ
WWW.1AGRO.KZ
ИЛИ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ QR-КОДОМ



ПЕРВАЯ
АГРОХИМИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ

ФАРАДЕЙ®
К.С.

ФАРАДЕЙ®

Универсальный комбинированный системный препарат инсектицидно-фунгицидного действия для обработки семян зерновых и зернобобовых культур против комплекса семенных, почвенных, аэрогенных инфекций, а также сосущих и грызущих вредителей всходов.

ТРЕХКОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ ПРОДУКТА

Клотиаиндин, 250 г/л

Инсектицид системного действия из класса неоникотиноидов. Гибель насекомого наступает в результате нервного перевозбуждения, проявляющегося в непроизвольном треморе всего тела с последующей протрацией и параличем.




Флутриафол, 75 г/л

Фунгицид из класса триазолов. Даже при многократном увеличении нормы расхода не оказывает фитотоксического и ретардантного действия на растительные ткани и надежно защищает их от проникновения паразитических грибов.

Бета-цифлутрин, 150 г/л

Инсектицид контактно-кишечного действия из группы пиретроидов. Обладает сильными репеллентными свойствами. Механизм действия основан на нарушении деятельности нервной системы вредителя.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА И РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ФАРАДЕЙ®



- 1 - вход в шлюзовой дозатор
 - 2 - загрузочная воронка
 - 3 - диск распределения семян
 - 4 - диск-разбрызгиватель протравочной машины
 - 5 - подача протравителя
 - 6 - дополнительный смеситель с лопастями
- ↓ - выход протравленных семян

Культура	Пшеница и ячмень яровые
Норма расхода, л/т	0,3 - 0,4
Вредный объект	Твердая, каменная головня, корневые гнили, плесневение семян, пшеничный трипс, стеблевая и полосатая хлебная блошки.
Способ, время обработки	Протравливание семян суспензией препарата 10 л на 1 тонну семян.

СПЕКТР ДЕЙСТВИЯ

ФАРАДЕЙ®

Пыльная головня пшеницы, ячменя (*Ustilago spp.*)

Шведская муха (*Oscinella pusilla*)

Гессенская муха (*Mayetiola destructor*)

Блошки (хлебная полосатая, большая стеблевая)

Почвенные вредители (проволочники, ложнопроволочники)

Твердая, каменная головня пшеницы, ячменя (*Tilletia caries*, *Ustilago hordei*)

Плесневение семян (грибы рода *Penicillium*, *Aspergillus*, *Trichotecium*, *Mucor*)

Гельминтоспориозная корневая гниль (*Bipolaris sorokiniana*)

*1 - эффективность 60-70%
2 - эффективность 75-80%
3 - эффективность 100%

ПЕРИОД ЗАЩИТНОГО ДЕЙСТВИЯ ПРОТРАВИТЕЛЯ СЕМЯН ФАРАДЕЙ®

Защитное действие

Сдерживающее действие

