РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
СКАУТ® УЛЬТРА

Культура	Норма расхода	Способ, время применения	Вредный объект
Пшеница яровая	0,3-0,45 л/га	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам (независимо от фазы развития культуры). Для достижения максимального эффекта рекомендована обработка на ранних стадиях развития сорных злаков в фазе 2-3 листьев	Однолетние злаковые сорняки

Щетинник виды

Лисохвост мышехвостиковый

Куриное просо

Падалица кукурузы

Овсюг обыкновенный

Просо виды

Эффективность СКАУТ® УЛЬТРА. НПЦЗХ им. А.И. Бараева, 2019 год.

СКАУТ® УЛЬТРА не обладает почвенным действием. Нет ограничений в севообороте. Испытания **СКАУТ® УЛЬТРА** не выявили случаев проявления фитотоксичности по отношению к культурным растениям.

БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ВЫ СМОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ НА НАШЕМ САЙТЕ WWW.1AGRO.KZ
ИЛИ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ QR-КОДОМ

Первая Агрохимическая Компания

СКАУТ® УЛЬТРА, к.э.

концентрат эмульсии

СКАУТ® УЛЬТРА

Высокоселективный комбинированный гербицид для послевсходовой обработки пшеницы против широкого спектра однолетних злаковых сорняков

Благодаря наличию двух действующих веществ в своем составе **СКАУТ® УЛЬТРА** поглощается наземными органами растений и накапливается в точках роста, практически уже через сутки в значительной степени устраняет конкуренцию сорных растений для культуры. Полная гибель сорняков наступает в течение 10-15 суток после опрыскивания, в зависимости от погодных условий и вида сорного растения. Препарат обладает усиленным действием на ***просовидные сорные растения*** и ***щетинники***, а также обладает высоким уровнем контроля ***овсюга обыкновенного*** в посевах пшеницы. Благодаря своей концентрированной форме, **СКАУТ® УЛЬТРА** удобен в применении и хранении.

Клодинафоп-пропаргил, 48,5 г/л

- действующее вещество с системным механизмом действия, относится к химическому классу – арилоксифеноксипропионаты. В составе **СКАУТ® УЛЬТРА,** клодинафоп-пропаргил проникает в сорное растение через листья, перемещается к его меристемным точкам роста, где препятствует биосинтезу липидов, необходимых для роста растений. В результате этого, активный рост сорняков прекращается уже в течение первых часов после обработки.

Феноксапроп-п-этил, 170 г/л

относится к химическому классу – арилоксифеноксипропионаты. Феноксапроп-п-этил быстро поглощается листьями и передвигается в базипетальном и акропетальном направлениях в различные органы растения. В растениях вещество подвергается гидролизу, в результате чего получается свободная кислота феноксипропа, которая тормозит образование жирных кислот. У злаковых сорняков в зонах роста прекращается синтез клеточных мембран.

Клоквинтоцет-мексил, 57 г/л

– антидот, усиливает активность ферментов деградации и ускоряет распад действующих веществ клодинафоп-пропаргил и феноксапроп-п-этил в тканях культурных растений, что повышает безопасность **СКАУТ® УЛЬТРА** для обрабатываемой культуры. Благодаря наличию клоквинтоцет-мексил в своем составе, **СКАУТ® УЛЬТРА** обладает широким диапазоном сроков применения.

Принцип действия клоквинтоцет-мексил



ПОТЕРИ УРОЖАЯ ПШЕНИЦЫ ОТ ЗАСОРЕННОСТИ ОВСЮГОМ

Уровень засоренности овсюгом, шт/кв.м.	Потери урожая пшеницы при одновременном проявлении всходов овсюга с культурой, %	Фактор времени* появления всходов, (+/-)
5,5	8	0,5
11	11	1
22	16	1
33	19	2
55	25	2
89	32	2,5
111	35	2,5
165	43	3
222	50	3

Источник: ALBERTA - Agriculture Food and Rural Development, CANADA

** Следует прибавить либо отнять соответствующее число за каждый день появления овсюга до или после момента всходов культуры. Например, если овсюг при 22 растениях на кв.м. всходит на три дня раньше культуры, то потери урожая возрастают с 16% до 19%*

ЗАВИСИМОСТЬ УРОЖАЙНОСТИ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СКАУТ® УЛЬТРА



Эффективность СКАУТ® УЛЬТРА. НПЦЗХ им. А.И. Бараева, 2019 год.