



ПЕРВАЯ
АГРОХИМИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



2025



Уважаемые партнеры и коллеги!

Рады представить вашему вниманию каталог нашей продукции — комплекса современных решений в области защиты растений, разработанных с учетом последних достижений агрохимии, биотехнологий и фитосанитарного мониторинга.

В условиях возрастающих вызовов сельскохозяйственного производства — от изменения климата до роста устойчивости вредителей и патогенов — мы стремимся предоставлять высокоэффективные препараты, которые обеспечивают надежную защиту урожая, повышают его качество и помогают оптимизировать агротехнологические процессы.

Наша миссия: Обеспечить аграриев современными и безопасными решениями для защиты растений, способствуя повышению урожайности и сохранению природных ресурсов.

Задачи:

- Предоставить полный и актуальный обзор средств защиты растений, доступных на рынке.
- Информировать о передовых технологиях и инновационных подходах в защите сельскохозяйственных культур.
- Поддерживать аграриев в выборе наиболее эффективных решений для их хозяйств.

Наши приоритеты:


- **Эффективность и качество.** Мы предлагаем проверенные средства, адаптированные к климатическим и почвенным условиям Казахстана.
- **Инновации и технологии.** Мы активно поддерживаем внедрение современных технологий и разработок в сфере защиты растений: использование новых комбинаций действующих веществ и усовершенствование мониторинга вредных объектов.
- **Экологическая безопасность.** Забота об окружающей среде — наш приоритет: мы стремимся к сохранению здоровья почвы, воды и биоразнообразия.
- **Доступность и поддержка.** Мы предоставляем современные рекомендации и экспертную помощь на поле каждому клиенту, с учетом опыта наших сотрудников.

Этот каталог станет вашим надежным помощником в выборе не только средств защиты растений, но и современных технологий, которые помогут вам достичь новых высот в производительности и устойчивости. Вместе мы движемся к инновационному будущему сельского хозяйства!

Желаем вам успешного сезона, высоких урожаев и новых достижений!

С уважением, коллектив

ОО «Первая Агрохимическая Компания»



Адреса филиалов:

Головной офис

Республика Казахстан, 010000, г. Астана,
район Нұра, ул. Е 251, здание 11
тел: +7 (7172) 257-000, 257-777, +7 701 745 8836
E-mail: office@1agro.kz, Сайт: www.1agro.kz

Представитель в г. Караганда

тел.: +7 705 7451889, +7 701 7458836, +7 701 0145375

Филиал в г. Кокшетау

020000, г. Кокшетау, мкр. Центральный 41Б
тел: +7 701 5718019, +7 777 3106198, +7 701 7695726

Филиал Акмолинской области

020400, г. Атбасар, БЦ "Жаксы", каб. 209
тел.: +7 771 0852991, +7 771 0331288, +7 701 7458836

Филиал Акмолинской области

020900, г. Есиль, ул. Гарышкерлер, 34
тел.: +7 705 7451887, +7 701 7458836

Филиал в г. Костанай

110000, г. Костанай, ул. Чехова, 105А, офис 201
тел.: +7 (7142) 569244, +7 701 9520932, +7 771 1010180,
+7 777 8370909, +7 777 3373992

Филиал в г. Павлодар

140000, г. Павлодар, ул. Короленко, 109, этаж 2, каб. 204
тел.: +7 705 7451880, +7 701 5718019, +7 701 7458836

Филиал в г. Петропавловск

150000, г. Петропавловск, ул. Пушкина, 43
тел.: +7 (7152) 529924, 530533, +7 777 5122687, +7 701 0266261,
+7 705 5057507, +7 705 2614285, +7 777 1441121, +7 705 7554039

Представитель Северо-Казахстанская область

150400, р-н Г. Мусрепова, с. Новоишимское
+7 777 3044246

Филиал в г. Усть-Каменогорск

070008, г. Усть-Каменогорск, ул. Базовая 7/4, 2 этаж
тел.: +7 705 7451890, +7 705 9894778



Содержание

Адреса филиалов	1
Содержание	2-5

ПРОТРАВИТЕЛИ

Аксион <i>протиоконазол 40 г/л + азоксистробин 40 г/л + флутриафол 90 г/л</i>	6
Активо <i>флутриафол 137 г/л + тебуконазол 107 г/л</i>	7
Арнейс <i>клотианидин 150 г/л + тебуконазол 60 г/л</i>	8
Калисто <i>тиаметоксам 250 г/л + флутриафол 87 г/л</i>	9
Калибр <i>клотианидин 600 г/л</i>	10-11
Кронос Ультра <i>флутриафол 120 г/л + азоксистробин 80 г/л + тиабендазол 80 г/л</i>	12-13
Кронос <i>флутриафол 105 г/л + пираклостробин 47 г/л + металаксил 93 г/л</i>	14
Кросс <i>тебуконазол 80 г/л + тиаметоксам 187 г/л + клотианидин 187 г/л</i>	15
Мистраль <i>флутриафол 67 г/л + тебуконазол 50 г/л + пираклостробин 60 г/л + тиаметоксам 337 г/л</i>	16
Одиссей 2.0 <i>тритиконозол 20 г/л + флутриафол 125 г/л + пираклостробин 60 г/л</i>	17
Пилигрим <i>тиаметоксам 350 г/л + флутриафол 87 г/л + металаксил 43 г/л</i>	18
Спектр Форте <i>флутриафол 160 г/л + пираклостробин 40 г/л</i>	19
Сильверадо <i>флутриафол 200 г/л</i>	20
Сильверадо Про <i>флутриафол 62,5 г/л + тебуконазол 30 г/л + пираклостробин 60 г/л</i>	21
Толедо <i>тиофанат-метил 480 г/л + тебуконазол 120 г/л</i>	22-23
Фарадей <i>флутриафол 75 г/л + бета-цифлутрин 150 г/л + клотианидин 250 г/л</i>	24
Элатос <i>клотианидин 410 г/л + флутриафол 50 г/л + флудиоксонил 50 г/л</i>	25
Элирен <i>мефеноксам 60 г/л + тебуконазол 60 г/л</i>	26
Эрида <i>протиоконазол 107 г/л + тебуконазол 73 г/л</i>	27

ГЕРБИЦИДЫ

Беллисимо <i>феноксапроп-п-этил 140 г/л + клоквинтоцет-мексил 50 г/л</i>	28
Беллисимо 2.0 <i>феноксапроп-п-этил 200 г/л + клоквинтоцет-мексил 50 г/л</i>	29
Беллисимо Лайт <i>феноксапроп-п-этил 120 г/л + клоквинтоцет-мексил 23 г/л</i>	30
Брэмбо <i>2,4-Д эфир 552 г/л + дикамба 60 г/л</i>	31
Дискатор Форте <i>флорасулам 5 г/л + флуроксипир 50 г/л + 2,4-Д кислоты в виде сложного эфира 410 г/л</i>	32
Канонир 3.0 <i>амидосульфурон 350 г/кг + тифенсульфурон-метил 350 г/кг + метсульфурон-метил 50 г/кг</i>	33
Каскад <i>трибенурон-метил 750 г/кг</i>	34
Каскад Премиум <i>трибенурон-метил 410 г/кг + тифенсульфурон-метил 140 г/кг + флорасулам 200 г/кг</i>	35
Каскад Про <i>трибенурон-метил 600 г/кг + флорасулам 150 г/кг</i>	36-37
Каскад Форте <i>трибенурон-метил 375 г/кг + тифенсульфурон-метил 375 г/кг</i>	38
Каскад Экспресс <i>трибенурон-метил 670 г/кг + тифенсульфурон-метил 80 г/кг</i>	39
Кассар Про <i>метсульфурон-метил 390 г/кг + трибенурон-метил 260 г/кг + амидосульфурон 100 г/кг</i>	40-41
Кинетик <i>клетодим 240 г/л</i>	42
Кинетик Лайт <i>клетодим 120 г/л</i>	43
Кинетик Форте <i>клетодим 137 г/л + хизалафоп-п-этил 73 г/л</i>	44
Леггеро Форте <i>клодинафоп-пропаргил 240 г/л + клоквинтоцет-мексил 60 г/л</i>	45
Магеллан <i>трибенурон-метил 500 г/кг + амидосульфурон 250 г/кг</i>	46

Магеллан Форте	трибенурон-метил 450 г/кг + амидосульфурон 210 г/кг + флорасулам 90 г/кг	47
Махаон Про	римсульфурон 35 г/кг + никосульфурон 120 г/кг + мезотрион 370 г/кг	48-49
Махаон	никосульфурон 230 г/кг + мезотрион 570 г/кг	50
Москит Премиум	трибенурон-метил 563 г/кг + флорасулам 187 г/кг	51
Москит Форте	трибенурон-метил 670 г/кг + тифенсульфурон-метил 80 г/кг	52
Прогресс	2,4-Д эфир 905 г/л	53
Прогресс 720	2,4-Д соль 720 г/л	54
Прогресс Гранд	2,4-Д к-ты в виде сложн. эфира 440 г/л + флуроксипир 40 г/л + карфентразон-этил 20 г/л	55
Прогресс Ультра	2,4-Д кислоты в виде сложного эфира 510 г/л + флуроксипир 90 г/л	56
Селенит	амидосульфурон 600 г/кг + метсульфурон-метил 150 г/кг	57
Селенит Про	клопиралид 500 г/кг + амидосульфурон 200 г/кг + метсульфурон-метил 50 г/кг	58-59
Селенит Форте	клопиралид 710 г/кг + метсульфурон-метил 40 г/кг	60
Скаут Про	феноксапроп-п-этил 162 г/л + клодинафоп-пропаргил 80 г/л + клоквинтоцет-мексил 50 г/л	61
Скаут Ультра	феноксапроп-п-этил 170 г/л + клодинафоп-пропаргил 48,5 г/л + клоквинтоцет-мексил 57 г/л	62
Скаут Форте	феноксапроп-п-этил 140 г/л + клодинафоп-пропаргил 90 г/л + клоквинтоцет-мексил 72 г/л	63
Смарагд	феноксапроп-п-этил 69 г/л + клоквинтоцет-мексил 34,5 г/л	64
Смарагд Форте	феноксапроп-п-этил 140 г/л + клоквинтоцет-мексил 70 г/л	65
Солекс	МЦПА соль 750 г/л	66
Солекс Про	МЦПА 570 г/л	67
Сольвер	хизалафоп-п-тефурил 120 г/л	68
Спирит	клопиралид 750 г/кг	69
Спирит Лайт	клопиралид 124 г/л + МЦПА 367 г/л	70
Станис Про	амидосульфурон 400 г/кг + тифенсульфурон-метил 200 г/кг + метсульфурон-метил 150 г/кг	71
Сэнтиум	клопиралид 300 г/л	72
Сэнтиум 600	клопиралид 600 г/л	73
Эдванс 2.0	метсульфурон-метил 391 г/кг + трибенурон-метил 359 г/кг	74
Эрликон	феноксапроп-п-этил 90 г/л + клодинафоп-пропаргил 45 г/л + клоквинтоцет-мексил 34,5 г/л	75

ГЕРБИЦИДЫ ГЛИФОСАТЫ

ХИТ	глифосат кислота 540 г/л	76
-----	--------------------------	----

ГЕРБИЦИДЫ ИМИДАЗОЛИНОНЫ

Паладин	имазамокс 700 г/кг	77
Паладин 120	имазамокс 120 г/л	78
Паладин Ультра	имазамокс 330 г/кг + имазапир 150 г/кг	79

ФУНГИЦИДЫ

Бескар	тебуконазол 317 г/л + пираклостробин 83 г/л + ципроконазол 97 г/л	80-81
Байтан	триадименол 97 г/л + тебуконазол 397 г/л	82
Варро	тебуконазол 500 г/л + карбендазим 50 г/л	83
Гарда	тебуконазол 387 г/л + альфа-циперметрин 47 г/л + тиаметоксам 67 г/л	84-85
Капри	пираклостробин 80 г/л + триадименол 70 г/л + тебуконазол 350 г/л	86-87
Консорт	тебуконазол 200 г/л + карбендазим 300 г/л	88-89
Лантус	флутриафол 200 г/л + тиофанат-метил 200 г/л + металаксил 100 г/л	90
Лантус Форте	боскалид 57 г/л + тиофанат-метил 193 г/л + флутриафол 247 г/л	91
Лира	тебуконазол 417 г/л + тиаметоксам 83 г/л	92
Реми 2.0	тебуконазол 170 г/л + триадименол 47 г/л	93
Сансэр	тебуконазол 381 г/л + флутриафол 117 г/л	94
Сансэр Комби	тебуконазол 337 г/л + флутриафол 78 г/л + клотианидин 73 г/л	95
Торрес	тиофанат-метил 250 г/л + тебуконазол 167 г/л + триадименол 43 г/л	96-97
Эмити	азоксистробин 90 г/л + тебуконазол 317 г/л + флутриафол 93 г/л	98-99

ИНСЕКТИЦИДЫ

Агрис	тиаметоксам 57 г/л + имидаклоприд 210 г/л + лямбда-цигалотрин 105 г/л	100-101
Арни	тиаметоксам 180 г/л + бета-цифлутрин 60 г/л	102
Бинго	бета-цифлутрин 125 г/л	103
Вектор	хлорантранилипрол 110 г/л + лямбда-цигалотрин 55 г/л	104-105
Ганимед	лямбда-цигалотрин 250 г/л	106
Гедеон Прайм	тиаметоксам 257 г/л + лямбда-цигалотрин 142 г/л	107
Доберман	тиаметоксам 130 г/л + имидаклоприд 70 г/л + альфа-циперметрин 147 г/л	108-109
Импера	эсфенвалерат 100 г/л	110
Корвус	альфа-циперметрин 300 г/л	111
Орфей	тиаметоксам 700 г/кг	112
Рейв	альфа-циперметрин 100 г/л + дифлубензурон 120 г/л	113
Террано	имидаклоприд 210 г/л + бета-цифлутрин 90 г/л	114
Флейм	альфа-циперметрин 117 г/л + тиаметоксам 147 г/л	115
Фобос	альфа-циперметрин 200 г/л	116-117
Эвелин	абамектин 90 г/л + тиаметоксам 270 г/л	118
Элистер	индоксакарб 150 г/л	119

ДЕСИКАНТ

Спортак <i>дикват 300 г/л</i>	120
Для заметок	121
Общие рекомендации	122
Протравливание и посев	123
Регламенты применения препаратов на поле	124
Порядок приготовления рабочей жидкости	124
Порядок очередности загрузки препаратов	125
Очистка опрыскивателя	125





АКСИОН



Действующее вещество:
флутриафол 90 г/л
азоксистробин 40 г/л
протиоконазол 40 г/л



Препаративная форма:
концентрат суспензии (КС)



Упаковка:
5 литров

Современный трёхкомпонентный системный фунгицид для обработки семян зерновых и зернобобовых культур, от комплекса семенных, почвенных и аэрогенных инфекций.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА

- Эффективная защита от всех видов головневых заболеваний.
- Широкий спектр подавляемых патогенов.
- Стимулирующий эффект на рост и развитие культуры благодаря наличию в составе компонента стробилуриновой группы (азоксистробина).
- Снижение риска возникновения резистентности за счет комбинации действующих веществ с разными механизмами действия.
- Высокая реализация потенциала урожайности различных культур.

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Зерновые культуры: пыльная головня пшеницы (*Ustilago nuda* f. sp. tritici), твердая головня пшеницы (*Tilletia caries*), гельминтоспориозная корневая гниль (*Bipolaris sorokiniana*), фузариозная корневая гниль (*Fusarium* spp.), ризоктониозная (*Rhizoctonia solani*), септориозная пятнистость (*Stagonospora nodorum*), снежная плесень (*Microdochium vale*), плесневение семян (грибы рода *Aspergillium*, *Penicillium* и другие), каменная головня ячменя (*Ustilago hordei*), ложная пыльная головня (*Ustilago nigra*), сетчатая пятнистость (*Drechslera teres*), полосатая пятнистость (*Pyrenophora graminea*).

Зернобобовые культуры: плесневение семян (грибы рода *Aspergillium*, *Penicillium* и другие), аскохитоз (*Ascochyta*spp.), антракноз (*Colletotrichum*pisi), фузариоз (*Fusarium* spp.), серая гниль (*Botrytis cinerea*)

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Норма расхода	Вредный объект	Способ, время обработки
Пшеница яровая	0,35 л/т	Твердая, пыльная головня, плесневение семян, корневые гнили головня, плесневение семян, корневые гнили	Протравливание семян суспензией препарата. Расход рабочей жидкости - в зависимости от культуры
Ячмень яровой	0,35 л/т	Пыльная, каменная головня, плесневение семян, корневые гнили	
Соя	0,4 л/т	Аскохитоз, фузариоз, серая гниль, плесневение семян	
Чечевица	0,4 л/т		
Горох	0,4 л/т		



АКТИВО



Действующее вещество:
флутриафол 137 г/л
тебуконазол 107 г/л



Препаративная форма:
концентрат суспензии (КС)



Упаковка:
5 литров

Комбинированный фунгицидный протравитель системного действия для обработки семян пшеницы, ячменя и льна, против комплекса семенных, почвенных и аэрогенных инфекций.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА

- Надежная защита семян от комплекса заболеваний.
- Высокая эффективность - низкий риск появления устойчивых форм патогенов.
- Два действующих вещества проявляют синергизм и оказывают лечебное и продолжительное профилактическое действие.
- Хороший партнер для баковых смесей с инсектицидными протравителями.

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Зерновые культуры: гельминтоспориозная корневая гниль (*Bipolaris sorociniana*), фузариозная корневая гниль (ячменя (*Fusarium graminearum*), твердая головня пшеницы (*Tilletia caries*), пыльная головня пшеницы (*Ustilago nuda* f. sp. tritici), пыльная головня ячменя (*Ustilago nuda* f. sp. hordei), твердая головня ячменя (*Ustilago hordei*).

Лен: антракноз (*Colletotrichum lini*), фузариоз (*Fusarium* spp.), плесневение семян (грибы из рода *Aspergillus*, *Penicillium* и другие).



РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Норма расхода	Вредный объект	Способ, время обработки
Пшеница яровая	0,15 л/т	Твердая, пыльная головня, корневые гнили, плесневение семян	Протравливание семян суспензией препарата. Расход рабочей жидкости - в зависимости от культуры
Ячмень яровой	0,15 л/т	Каменная, пыльная головня, корневые гнили, плесневение семян	
Лен	0,15 л/т	Корневые гнили, фузариоз, антракноз	



АРНЕЙС



Действующее вещество:
тебуконазол 60 г/л
клотианидин 150 г/л



Препаративная форма:
концентрат суспензии (КС)



Упаковка:
5 литров

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Болезни зерновых культур: пыльная (*Ustilago tritici*), твердая (*Tilletia caries*) головня, каменная (*Ustilago hordei*), ложная пыльная (*Ustilago nigra*) головня, гельминтоспориозная (*Bipolaris sorokiniana*), фузариозная (*Fusarium* spp.), ризоктониозная (*Rhizoctonia solani*) корневые гнили, септориоз (*Septoria* spp.), плесневение семян (грибы рода *Aspergillium*, *Penicillium* и другие), сетчатая пятнистость (*Drechslera teres*), полосатая пятнистость (*Pyrenophora graminea*).

Вредители зерновых культур: блошки, трипсы, злаковые мухи, скрытностеблевые вредители, проволочники и ложнопроволочники.

Универсальный комбинированный системный препарат с инсектицидными и фунгицидными свойствами для обработки семян зерновых культур против комплекса семенных, почвенных, аэрогенных инфекций, а также сосущих и грызущих вредителей всходов.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА

- Передовой способ защиты – инсекто-фунгицидный препарат для обработки семян.
- Непревзойденный контроль головневых заболеваний.
- Эффективная комбинация двух действующих веществ фунгицидного и инсектицидного действия.
- Одна обработка заменяет две.
- Снижает производственную нагрузку – минус одна обработка всходов культуры инсектицидами.
- Всходы культуры под надежной защитой.
- Высокая реализация потенциала урожайности зерновых культур.



Контроль: всходы пшеницы без применения инсектицидного протравителя



Арнейс : 0,4 л/т

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Норма расхода	Вредный объект	Способ, время обработки
Пшеница яровая и ячмень яровой	0,4 л/т	Пыльная головня, плесневение семян, корневые гнили, блошки, пшеничный трипс, почвенные вредители (проволочники, ложнопроволочники)	Протравливание семян суспензией препарата. Расход рабочей жидкости - в зависимости от культуры



КАЛИСТО



Действующее вещество:
тиаметоксам 250 г/л
флутриафол 87 г/л



Препаративная форма:
концентрат суспензии (КС)



Упаковка:
5 литров

Комбинированный системный препарат с инсектицидными и фунгицидными свойствами для обработки семян зерновых и зернобобовых культур против комплекса семенных, почвенных, аэрогенных инфекций, а также сосущих и грызущих вредителей всходов.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА

- Передовой способ защиты – инсекто-фунгицидный препарат для обработки семян.
- Высокоэффективная комбинация двух действующих веществ фунгицидного и инсектицидного действий.
- Одна обработка заменяет две.
- Снижает производственную нагрузку – минус одна обработка всходов культуры инсектицидами.
- Всходы культуры под надежной защитой.
- Высокая реализация потенциала урожайности зерновых и бобовых культур.

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Болезни зерновых культур: пыльная головня пшеницы (*Ustilago tritici*), твердая головня пшеницы (*Tilletia caries*), каменная головня ячменя (*Ustilago hordei*), ложная пыльная (*Ustilago nigra*) головня, гельминтоспориозная (*Bipolaris sorokiniana*), фузариозная (*Fusarium spp.*), ризоктониозная (*Rhizoctonia solani*) корневые гнили, септориоз (*Septoria spp.*), плесневение семян (грибы рода *Aspergillum*, *Penicillium* и другие), сетчатая пятнистость (*Drechslera teres*), полосатая пятнистость (*Pyrenophora graminea*).

Вредители зерновых культур: блошки, трипсы, злаковые мухи, скрытностеблевые вредители, проволочники и ложнопроволочники.

Чечевица, соя, горох: плесневение семян (грибы рода *Aspergillum*, *Penicillium* и другие), аскохитоз (*Ascochyta spp.*), антракноз (*Colletotrichum pisi*), фузариоз (*Fusarium spp.*), серая гниль (*Botrytis cinerea*).

Вредители зернобобовых культур: клубеньковые долгоносики, проволочники и ложнопроволочники, тля, блошки.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Норма расхода	Вредный объект	Способ, время обработки
Пшеница яровая	0,4-0,5 л/т	Твердая, пыльная головня, плесневение семян, корневые гнили, блошки, гессенская муха, пшеничный трипс, почвенные вредители (проволочники, ложнопроволочники)	Протравливание семян суспензией препарата. Расход рабочей жидкости - в зависимости от культуры
Ячмень яровой	0,4-0,5 л/т	Каменная, пыльная головня, плесневение семян, корневые гнили, блошки, шведская муха, почвенные вредители (проволочники, ложнопроволочники)	
Соя Горох Чечевица	0,4-0,5 л/т	Аскохитоз, фузариоз, серая гниль, плесневение семян, клубеньковые долгоносики, почвенные вредители (проволочники, ложнопроволочники)	



КАЛИБР



Действующее вещество:
клотианидин 600 г/л



Препаративная форма:
концентрат суспензии (КС)



Упаковка:
5 литров

Инсектицидный протравитель системного действия, обладающий мощным контактно-кишечным действием на вредителей всходов рапса и других культур.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА

- Одно из лучших решений для защиты всходов рапса на ранней стадии развития.
- Пролонгированный период действия.
- Совместимость с фунгицидными протравителями = возможность для комплексной защиты семян от вредителей и патогенов.
- Улучшенная препаративная форма с высоким содержанием ПАВ.
- Низкая норма расхода препарата = низкая нагрузка на окружающую среду.
- Усиливает ростовые процессы и антистрессовые свойства культуры.

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Проволочники (*Agriotes* spp.) и другие почвообитающие вредители, злаковые мухи (гессенская, шведская), виды блошек и прочие.



Повреждения всходов льна без применения инсектицидного протравителя



Калибр: защита всходов льна от льняного трипса и блошек

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Протравливание семян осуществляют на протравочных машинах любого типа. Благодаря эффективному прилипателю препарат надежно удерживается на поверхности семян и в дальнейшем при погрузочно-разгрузочных работах не осыпается с семян и не образует пыли.

Для достижения максимального защитного эффекта регулярно контролируйте равномерность нанесения и качество покрытия поверхности семян препаратом. Качество обработки определяется равномерностью и интенсивностью окрашивания семян. Рекомендуемый расход рабочей жидкости для протравливания семян зерновых культур 10 л/т. Используйте для протравливания чистые, не содержащие посторонних примесей, хорошо откалиброванные и не поврежденные семена. Не применяйте препарат для обработки проросших семян и семян с повышенной влажностью.



РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Норма расхода	Вредный объект	Способ, время обработки
Рапс	3,0-5,0 л/т	Комплекс почвенных вредителей, крестоцветная блошка	Протравливание семян суспензией препарата. Расход рабочей жидкости - в зависимости от культуры
Пшеница яровая и ячмень яровой	0,2-0,25 л/т	Трипсы, блошки, проволочники, ложнопроволочники	
Лен	0,6-0,8 л/т	Проволочники, ложнопроволочники, льняные блошки, трипсы	
Чечевица	0,3-0,35 л/т	Проволочники, ложнопроволочники, подгрызающие совки, клубеньковые долгоносики	



КРОНОС УЛЬТРА



Действующее вещество:

флутриафол 120 г/л
тиабендазол 80 г/л
азоксистробин 80 г/л



Препаративная форма:
концентрат суспензии (КС)



Упаковка:
5 литров

СКОРОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Быстрая начальная
активность с момента
обработки.

Трёхкомпонентный фунгицидный протравитель системного действия для обработки семян зерновых и зернобобовых культур против комплекса семенных, почвенных и аэрогенных инфекций.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА

Наличие в составе препарата трех действующих веществ из разных химических классов с разным механизмом действия обеспечивает:

- Широкий спектр контроля заболеваний.
- Ярко выраженное действие на различные виды корневых гнилей (*Fusarium* spp., *Cochliobolus* spp. и т. д.) за счет комбинации трех действующих веществ.
- Универсальность, как при оптимальных, так и при поздних сроках сева.
- Высокую реализацию потенциала урожайности различных культур.
- Высокую защиту семени и проростка.
- Высокую экономическую эффективность применения протравителя.
- Высокие показатели стрессоустойчивости культуры за счет азоксистробина.



КРОНОС УЛЬТРА защищает культурные растения от комплекса болезней, передающихся с семенами и через почву с момента прорастания семян до конца кущения зерновых культур. На зернобобовых культурах период защитного действия от момента прорастания до начала бутонизации культуры (стадия 17-51 по шкале Задокса).

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Зерновые культуры: пыльная (*Ustilago tritici*), твердая (*Tilletia caries*) головня, гельминтоспориозная (*Bipolaris sorokiniana*), фузариозная (*Fusarium* spp.), ризоктониозная (*Rhizoctonia solani*) корневые гнили, септориоз (*Septoria* spp.), снежная плесень (*Microdochium nivale*), плесневение семян (грибы рода *Aspergillum*, *Penicillium* и другие), каменная (*Ustilago hordei*), ложная пыльная (*Ustilago nigra*) головня, сетчатая пятнистость (*Drechslera teres*), полосатая пятнистость (*Pyrenophora graminea*).

Бобовые культуры: плесневение семян (грибы рода *Aspergillum*, *Penicillium* и другие), аскохитоз (*Ascochyta* spp.), антракноз (*Colletotrichum pisi*), фузариоз (*Fusarium* spp.), серая гниль (*Botrytis cinerea*).



Чечевица: анализ семян на всхожесть и зараженность патогенами



Чечевица: поражение корневой системы корневыми гнилями.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Норма расхода	Вредный объект	Способ, время обработки
Пшеница яровая	0,25 л/т	Твердая, пыльная головня, корневые гнили, плесневение семян, стимулирование роста и развития	Протравливание семян суспензией препарата. Расход рабочей жидкости - в зависимости от культуры
Ячмень яровой	0,25 л/т	Каменная, пыльная головня, корневые гнили, плесневение семян, стимулирование роста и развития	
Чечевица	0,3 л/т	Аскохитоз, фузариоз, серая гниль, плесневение семян, стимулирование роста и развития	



КРОНОС



Действующее вещество:

флутриафол 105 г/л
металаксил 93 г/л
пираклостробин 47 г/л



Препаративная форма:
концентрат суспензии (КС)



Упаковка:
5 литров

Инновационный фунгицидный протравитель системно-трансламинарного действия для обработки семян зерновых, зернобобовых и масличных культур, против комплекса семенных, почвенных и аэрогенных инфекций.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА

Наличие в составе препарата трех действующих веществ из разных химических классов с разным механизмом действия обеспечивает:

- Яркое выраженное действие на различные виды корневых гнилей (*Fusarium* spp., *Cochliobolus* spp. и т.д.) за счет комбинации металаксила и флутриафола.
- Высокую защиту семени и проростка.
- Высокую экономическую эффективность применения протравителя.
- Возможность применения на бобовых культурах. Отсутствует фитотоксичность как на растение, так и на клубеньковые бактерии.

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Зерновые культуры: фузариозная корневая гниль (*Fusarium* spp.), гельминтоспориозная корневая гниль (*Bipolaris sorociniana*), септориозная пятнистость (*Stagonospora podorum*), полосатая пятнистость ячменя (*Pyrenophora graminea*), твердая головня пшеницы (*Tilletia caries*), пыльная головня пшеницы (*Ustilago nuda* f. sp. *tritici*), пыльная головня ячменя (*Ustilago nuda* f. sp. *hordei*), твердая головня ячменя (*Ustilago hordei*).

Лен: антракноз (*Colletotrichum lini*), фузариоз (*Fusarium* spp.), плесневение семян (грибы из рода *Aspergillus*, *Penicillium* и другие).

Зернобобовые: плесневение семян (грибы из рода *Aspergillus*, *Penicillium* и другие), аскохитоз (*Ascochyta* spp.), фузариоз (*Fusarium* spp.), антракноз (*Colletotrichum pisi*), серая гниль (*Botrytis cinerea*).

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Норма расхода	Вредный объект	Способ, время обработки
Пшеница яровая	0,2 л/т	Твердая, пыльная головня, корневые гнили, плесневение семян	Протравливание семян суспензией препарата. Расход рабочей жидкости - в зависимости от культуры
Ячмень яровой	0,2 л/т	Каменная, пыльная головня, корневые гнили, плесневение семян	
Лен	0,25 л/т	Корневые гнили, фузариоз, антракноз	
Чечевица	0,25 л/т	Корневые гнили, фузариоз, антракноз, аскохитоз	



КРОСС



Действующее вещество:

тебуконазол 80 г/л
тиаметоксам 187 г/л
клотианидин 187 г/л



Препаративная форма:
концентрат суспензии (КС)



Упаковка:
5 литров

Комбинированный инсекто-фунгицидный протравитель семян с/х культур (пшеница, ячмень, лен) против комплекса семенных, почвенных, аэрогенных инфекций, а также комплекса вредителей всходов.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА

- Сочетание инсекто-фунгицидных действующих веществ в препарате позволяет одной обработкой защитить культуру от комплекса вредителей и болезней.
- Надёжный контроль комплекса вредителей, повреждающих корневую систему и надземные органы всходов культуры вне зависимости от условий среды.
- Снижение производственной нагрузки – одним протравливанием обеспечивается защита и от вредителей и от болезней.
- Высокая скорость и пролонгированное действие достигается благодаря синергизму действия активных ингредиентов продукта.

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Зерновые культуры: фузариозная корневая гниль (*Fusarium* spp.), гельминтоспориозная корневая гниль (*Bipolaris sorociniana*), септориозная пятнистость (*Stagonospora podorum*), полосатая пятнистость ячменя (*Pyrenophora graminea*), твердая головня пшеницы (*Tilletia caries*), пыльная головня пшеницы (*Ustilago nuda* f. sp. *tritici*), пыльная головня ячменя (*Ustilago nuda* f. sp. *hordei*), твердая головня ячменя (*Ustilago hordei*).

Лен: антракноз (*Colletotrichum lini*), фузариоз (*Fusarium* spp.), плесневение семян (грибы из рода *Aspergillus*, *Penicillium* и другие).

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Норма расхода	Вредный объект	Способ, время обработки
Пшеница яровая	0,3 л/т	Твердая, пыльная головня, плесневение семян, корневые гнили, блошки, гессенская муха, пшеничный трипс, почвенные вредители (проволочники, ложнопроволочники)	Протравливание семян суспензией препарата. Расход рабочей жидкости - в зависимости от культуры
Ячмень яровой	0,3 л/т	Каменная, пыльная головня, плесневение семян, корневые гнили, блошки, шведская муха, почвенные вредители (проволочники, ложнопроволочники)	
Лен масличный	0,3 л/т	Корневые гнили, фузариоз, антракноз, аскохитоз, трипсы, блошка, почвенные вредители (проволочники, ложнопроволочники)	



МИСТРАЛЬ



Действующее вещество:

флутриафол 67 г/л
тебуконазол 50 г/л
пираклостробин 60 г/л
тиаметоксам 337 г/л



Препаративная форма:
концентрат суспензии (КС)



Упаковка:
5 литров

Уникальный 4-компонентный комбинированный системный протравитель семян с/х культур (пшеница, ячмень, лен, горох, чечевица) против комплекса семенных, почвенных, аэрогенных инфекций, а также комплекса вредителей всходов.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА

- Готовое решение – в одной канистре: уникальный комбинированный состав препарата из 4 компонентов помогает исключить ошибки при приготовления баковых смесей.
- Снижение производственной нагрузки – одним протравливанием обеспечивается защита и от вредителей и от болезней.
- Эффективный контроль болезней зерновых культур за счёт синергизма трех фунгицидных компонентов.
- Высокоэффективная комбинация трёх действующих веществ фунгицидов снижает риск возникновения резистентности за счёт комбинации с разными механизмами действия.

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Зерновые культуры: фузариозная корневая гниль (*Fusarium spp.*), гельминтоспориозная корневая гниль (*Bipolaris sorociniana*), септориозная пятнистость (*Stagonospora nodorum*), полосатая пятнистость ячменя (*Pyronophora graminea*), твердая головня пшеницы (*Tilletia caries*), пыльная головня пшеницы (*Ustilago nuda f. sp. tritici*), пыльная головня ячменя (*Ustilago nuda f. sp. hordei*), твердая головня ячменя (*Ustilago hordei*).

Лен: антракноз (*Colletotrichum lini*), фузариоз (*Fusarium spp.*), плесневение семян (грибы из рода *Aspergillus*, *Penicillium* и другие).

Спектр активности тиаметоксама: проволочники (*Agriotes spp.*) и другие почвообитающие вредители, злаковые мухи (гессенская, шведская), виды блошек и прочие вредители с грызущим и колюще-сосущим ротовым аппаратом.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Норма расхода	Вредный объект	Способ, время обработки
Пшеница яровая	0,3 л/т	Твердая, пыльная головня, плесневение семян, корневые гнили, блошки, гессенская муха, пшеничный трипс, почвенные вредители (проволочники, ложнопроволочники)	Протравливание семян суспензией препарата. Расход рабочей жидкости - в зависимости от культуры
Ячмень яровой	0,3 л/т	Каменная, пыльная головня, плесневение семян, корневые гнили, блошки, шведская муха, почвенные вредители (проволочники, ложно-проволочники)	
Лен масличный	0,4 л/т	Корневые гнили, фузариоз, антракноз, аскохитоз, трипсы, блошка, почвенные вредители (проволочники, ложнопроволочники)	



ОДИССЕЙ 2.0



Действующее вещество:

флутриафол 125 г/л
пираклостробин 60 г/л
трифлуназол 20 г/л



Препаративная форма:
концентрат суспензии (КС)



Упаковка:
5 литров

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Твердая головня пшеницы (*Tilletia caries*), пыльная головня пшеницы (*Ustilago nuda* f. sp. *tritici*), пыльная головня ячменя (*Ustilago nuda* f. sp. *hordei*), твердая головня ячменя (*Ustilago hordei*), фузариозная корневая гниль (*Fusarium* spp.), гельминтоспориозная корневая гниль (*Bipolaris sorokiniana*), септориозная пятнистость (*Stagonospora nodorum*), полосатая пятнистость ячменя (*Pyrenophora graminea*), сетчатая пятнистость (*Drechslera teres*), плесневение семян (грибы из рода *Aspergillus*, *Penicillium* и другие).

Инновационный фунгицидный протравитель системно-трансламинарного действия для обработки семян зерновых культур, против комплекса семенных, почвенных и аэрогенных инфекций.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА

Наличие в составе препарата трех действующих веществ из разных химических классов с разным механизмом действия обеспечивает:

- Надежную защиту семян и проростков от основных заболеваний: пыльная и твердая головня, корневые и прикорневые гнили.
- Широкий спектр контроля заболеваний.
- Синергизм действия на ряд патогенов путем системно-трансламинарного действия трех молекул.
- Оптимальное проникновение и распределение в растении.
- Универсальность, как при оптимальных, так и при поздних сроках сева.
- Высокую реализацию потенциала урожайности зерновых культур.



РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Норма расхода	Вредный объект	Способ, время обработки
Пшеница яровая	0,2-0,3 л/т	Твердая, пыльная головня, корневые гнили, плесневение семян	Протравливание семян суспензией препарата. Расход рабочей жидкости - в зависимости от культуры
Ячмень яровой	0,2-0,3 л/т	Каменная, пыльная головня, корневые гнили, плесневение семян	



ПИЛИГРИМ



Действующее вещество:

тиаметоксам 350 г/л
флутриафол 87 г/л
металаксил 43 г/л



Препаративная форма:
концентрат суспензии (КС)



Упаковка:
5 литров

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Зерновые культуры: фузариозная корневая гниль (*Fusarium spp.*), гельминтоспориозная корневая гниль (*Bipolaris soroginiana*), септориозная пятнистость (*Stagonospora nodorum*), полосатая пятнистость ячменя (*Puccinophora graminea*), твердая головня пшеницы (*Tilletia caries*), пыльная головня пшеницы (*Ustilago nuda*), пыльная головня ячменя (*Ustilago nuda f. sp. hordei*), твердая головня ячменя (*Ustilago hordei*).

Лен: антракноз (*Colletotrichum lini*), фузариоз (*Fusarium spp.*), плесневение семян (грибы из рода *Aspergillus*, *Penicillium* и другие).

Зернобобовые: плесневение семян (грибы из рода *Aspergillus*, *Penicillium* и другие), аскохитоз (*Ascochyta spp.*), фузариоз (*Fusarium spp.*), антракноз (*Colletotrichum pisi*), серая гниль (*Botrytis cinerea*).

Комбинированный системный препарат с инсектицидными и фунгицидными свойствами для обработки семян зерновых и зернобобовых культур против комплекса семенных, почвенных, аэрогенных инфекций, а также сосущих и грызущих вредителей всходов.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА

Наличие в составе препарата двух действующих веществ фунгицидного действия из разных химических классов и с разным механизмом действия, и одного действующего вещества инсектицидного действия обеспечивает:

- Надежную защиту семян и проростков культуры от широкого спектра вредителей и болезней.
- Яркое выраженное действие на различные виды корневых гнилей (*Fusarium spp.*, *Cochliobolus spp.* и т.д.) за счет комбинации металаксила и флутриафола.
- Снижение количества требуемых обработок – одна обработка заменяет две.
- Оптимальное проникновение и распределение в растении компонентов препарата.
- Высокую реализацию потенциала урожайности зерновых культур.
- Готовая препаративная форма инсекто-фунгицидного протравителя исключает ошибки при приготовлении баковых смесей препаратов.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Норма расхода	Вредный объект	Способ, время обработки
Пшеница яровая, ячмень яровой	0,3 л/т	Твердая, пыльная, каменная головня, корневые гнили, плесневение семян, тли, трипсы, блошки, проволочники	Протравливание семян суспензией препарата. Расход рабочей жидкости - в зависимости от культуры
Чечевица	0,4 л/т	Корневые гнили, фузариоз, антракноз, аскохитоз, тля, клубеньковые долгоносики, проволочники	
Лен масличный	0,35 л/т	Корневые гнили, фузариоз, антракноз, аскохитоз, трипсы, проволочники	



СПЕКТР ФОРТЕ



Действующее вещество:
флутриафол 160 г/л
пираклостробин 40 г/л



Препаративная форма:
концентрат суспензии (КС)



Упаковка:
5 литров

Инновационный фунгицидный протравитель семян, обладающий пролонгированным защитным и лечебным эффектом семян зерновых и бобовых культур.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА

- Разный механизм действия триазольной и стробилуриновой группы.
- Длительное защитное действие от почвенных и аэробных патогенов.
- Высокие показатели стрессоустойчивости культуры.
- Пираклостробин – это стробилуриновая молекула нового поколения, не обладает канцерогенными свойствами, не проявляет мутагенных, иммунотоксичных свойств.



СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Твердая головня пшеницы (*Tilletia caries*), пыльная головня пшеницы (*Ustilago nuda* f. sp. *tritici*), пыльная головня ячменя (*Ustilago nuda* f. sp. *hordei*), твердая головня ячменя (*Ustilago hordei*), фузариозная корневая гниль (*Fusarium* spp.), гельминтоспориозная корневая гниль (*Bipolaris sorociniana*), септориозная пятнистость (*Stagonospora podorum*), полосатая пятнистость ячменя (*Pyrenophora graminea*), сетчатая пятнистость (*Drechslera teres*), плесневение семян (грибы из рода *Aspergillus*, *Penicillium* и другие).

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Норма расхода	Вредный объект	Способ, время обработки
Пшеница яровая, ячмень яровой	0,15-0,2 л/т	Твердая, пыльная, каменная головня, корневые гнили, плесневение семян	Протравливание семян суспензией препарата. Расход рабочей жидкости - в зависимости от культуры



СИЛЬВЕРАДО



Действующее вещество:
флутриафол 200 г/л



Препаративная форма:
концентрат суспензии (КС)



Упаковка:
5 литров

Фунгицидный протравитель системного действия для защиты семян зерновых культур от комплекса семенных и почвенных патогенов.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА

- Флутриафол является одной из наиболее «мягких» молекул триазольной группы и характеризуется отсутствием ретардантного эффекта даже при многократном увеличении нормы расхода.
- Высокая эффективность против наиболее злостных почвенных и внутрисеменных патогенов.
- Высокий экономический эффект применения благодаря относительно низкой стоимости обработки.
- Прекрасный партнер для баковых смесей с инсектицидными протравителями на основе клотианидина (КАЛИБР).

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Твердая головня пшеницы (*Tilletia caries*), пыльная головня пшеницы (*Ustilago nuda* f. sp. tritici), пыльная головня ячменя (*Ustilago nuda* f. sp. hordei), твердая головня ячменя (*Ustilago hordei*), гельминтоспориозная корневая гниль (*Bipolaris sorociniana*), фузариозная корневая гниль (*Fusarium* spp.), септориозная пятнистость (*Stagonospora nodorum*), плесневение семян (грибы из рода *Aspergillus*, *Penicillium* и другие).



РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Норма расхода	Вредный объект	Способ, время обработки
Пшеница яровая, ячмень яровой	0,12-0,15 л/т	Твердая, пыльная, каменная головня, корневые гнили, плесневение семян	Протравливание семян суспензией препарата. Расход рабочей жидкости - в зависимости от культуры



СИЛЬВЕРАДО ПРО



Действующее вещество:

флутриафол 62,5 г/л
тебуконазол 30 г/л
пираклостробин 60 г/л



Препаративная форма:
концентрат суспензии (КС)



Упаковка:
5 литров

Трёхкомпонентный фунгицидный протравитель семян с/х культур: пшеница, ячмень, лен, горох, соя, чечевица. Обладает системным действием, обеспечивает защиту семян от комплекса семенных и почвенных патогенов.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА

- Синергизм трех молекул позволяет эффективно контролировать гибель патогенов.
- Превосходная защита всходов культуры от основных инфекций в ранний период развития растений.
- Низкий риск возникновения резистентности у патогенов за счёт уникальной комбинации трех действующих веществ с разными механизмами действия.
- Длительный период защиты от почвенной и ранней аэрогенной инфекции, надёжная защита от основного комплекса возбудителей болезней зерновых культур.

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Зерновые культуры: гельминтоспориозная корневая гниль (*Bipolaris sorociniana*), фузариозная корневая гниль (ячменя (*Fusarium graminearum*), твердая головня пшеницы (*Tilletia caries*), пыльная головня пшеницы (*Ustilago nuda* f. sp. *tritici*), пыльная головня ячменя (*Ustilago nuda* f. sp. *hordei*), твердая головня ячменя (*Ustilago hordei*).

Лен: антракноз (*Colletotrichum lini*), фузариоз (*Fusarium* spp.), плесневение семян (грибы из рода *Aspergillus*, *Penicillium* и другие).

Зернобобовые культуры: плесневение семян (грибы из рода *Aspergillus*, *Penicillium* и другие), аскохитоз (*Ascochyta* spp.), фузариоз (*Fusarium* spp.), антракноз (*Colletotrichum pisi*).

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Норма расхода	Вредный объект	Способ, время обработки
Пшеница яровая, пшеница озимая, ячмень яровой	0,35 л/т	Твердая, пыльная головня, плесневение семян, корневые гнили	Протравливание семян суспензией препарата. Расход рабочей жидкости - в зависимости от культуры
Лен масличный	0,35-0,4 л/т	Корневые гнили, фузариоз, антракноз, аскохитоз	
Соя Горох	0,35-0,4 л/т	Корневые гнили, аскохитоз, фузариоз, плесневение семян	



ТОЛЕДО



Действующее вещество:
тебуконазол 120 г/л
тиофанат-метил 480 г/л



Препаративная форма:
концентрат суспензии (КС)



Упаковка:
5 литров



Уникальный комбинированный фунгицидный протравитель семян зерновых культур, против комплекса семенных, почвенных и аэрогенных инфекций обладающий пролонгированным защитным и лечебным действием.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА

- Сочетание двух активных молекул с профилактическим и лечущим действием обеспечивает пролонгированный период защиты от комплекса заболеваний посевов зерновых и масличных культур.
- Тиофанат–метил проникая в растение через корни - перемещается вверх по системе сосудов проявляя лечущее действие. Воздействует на инфекцию разными механизмами: нарушает деление ядра клетки, подавляет образование ростковых трубок при прорастании спор и конидий.
- Комбинация действующих веществ обладает антистрессовым действием – положительно влияет на всхожесть и корнеобразование даже при стрессовых климатических условиях (недостаток влаги, возвратные холода, переувлажнение).
- Предназначен для уничтожения спороношения фитопатогенных грибов, в значительной степени ограничивает зону поражения и способствует оздоровлению растений. Тиофанат-метил обладает стимулирующим действием на процессы фотосинтеза и активность хлорофильных пигментов. Этим объясняется озеленяющий эффект после обработки культуры фунгицидом.
- Оптимальное решение для реализации антирезистентной программы.
- Контроль развития инфекции: с момента обработки семенного материала внутренней, а также подавление развития наружной семенной инфекции после посева.

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Зерновые культуры: гельминтоспориозная корневая гниль (*Bipolaris sorociniana*), фузариозная корневая гниль (ячменя (*Fusarium graminearum*), твердая головня пшеницы (*Tilletia caries*), пыльная головня пшеницы (*Ustilago nuda* f. sp. *tritici*), пыльная головня ячменя (*Ustilago nuda* f. sp. *hordei*), твердая головня ячменя (*Ustilago hordei*).

Лен: антракноз (*Colletotrichum lini*), фузариоз (*Fusarium* spp.), плесневение семян (грибы из рода *Aspergillus*, *Penicillium* и другие).



Контроль: не обработанные семена пшеницы поврежденные корневыми гнилями



Толедо: защита корневой системы от семенной инфекции

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Норма расхода	Вредный объект	Способ, время обработки
Пшеница яровая	0,2 л/т	Твердая, пыльная головня, корневые гнили, плесневение семян, стимулирование роста и развития	Протравливание семян суспензией препарата. Расход рабочей жидкости - в зависимости от культуры
Ячмень яровой	0,2 л/т	Каменная, пыльная головня, корневые гнили, плесневение семян, стимулирование роста и развития	
Лен	0,2 л/т	Корневые гнили, фузариоз, антракноз	



ФАРАДЕЙ



Действующее вещество:
флутриафол 75 г/л
бета-цифлутрин 150 г/л
клотианидин 250 г/л



Препаративная форма:
концентрат суспензии (КС)



Упаковка:
5 литров

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Болезни зерновых культур: пыльная (*Ustilago tritici*), твердая (*Tilletia caries*) головня, каменная (*Ustilago hordei*), ложная пыльная (*Ustilago nigra*) головня, гельминтоспориозная (*Bipolaris sorokiniana*), фузариозная (*Fusarium spp.*), ризоктониозная (*Rhizoctonia solani*) корневые гнили, септориоз (*Septoria spp.*), плесневение семян (грибы рода *Aspergillum*, *Penicillium* и другие), сетчатая пятнистость (*Drechslera teres*), полосатая пятнистость (*Pyrenophora graminea*).

Вредители зерновых культур: блошки, трипсы, злаковые мухи, скрытностеблевые вредители, проволочники и ложнопроволочники.

Универсальный комбинированный системный препарат с инсектицидными и фунгицидными свойствами для обработки семян зерновых и зернобобовых культур против комплекса семенных, почвенных, аэрогенных инфекций, а также сосущих и грызущих вредителей посевов.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА

- Передовой способ защиты – инсекто-фунгицидный препарат для обработки семян.
- Высокоэффективная комбинация трех действующих веществ, одно - фунгицидного и два инсектицидного действия.
- Одна обработка заменяет две.
- Снижает производственную нагрузку – минус одна обработка всходов культуры инсектицидами.
- Всходы культуры под надежной защитой.



Контроль: повреждения всходов пшеницы хлебной полосатой блохой



Фарадей: эффективная инсектицидная защита всходов пшеницы от комплекса вредителей

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Норма расхода	Вредный объект	Способ, время обработки
Пшеница яровая, ячмень яровой	0,3-0,4 л/т	Твердая, пыльная, каменная головня, корневые гнили, плесневение семян, тли, трипсы, блошки	Протравливание семян суспензией препарата. Расход рабочей жидкости - в зависимости от культуры



ЗЛАТОС



Действующее вещество:

клотианидин 410 г/л
флутриафол 50 г/л
флудиоксонил 50 г/л



Препаративная форма:
концентрат суспензии (КС)



Упаковка:
1 литр (флакон)

Инсекто-фунгицидный протравитель клубней картофеля и семян зернобобовых культур против широкого спектра вредителей и болезней.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА

- Широкий спектр контролируемых основных вредителей и болезней зернобобовых культур и картофеля.
- Пролонгированный период защитного действия против вредителей за счет клотианидина.
- Защита от колорадского жука с момента посадки до цветения картофеля.
- Усиливает ростовые процессы и антистрессовые свойства культур.
- Снижение трудоемкости выращивания картофеля, одна протравка клубней картофеля равноценна двум обработкам (от вредителей и болезней).
- Дружные и быстрые всходы.

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

ЗЛАТОС эффективен против вредителей картофеля: проволочники (*Agriotes* spp.), колорадский жук (*Leptinotarsa decemlineata*), тля (*Aphidae* spp.).

Против болезней картофеля: ризоктониоз (*Rhizoctonia solani*), парша обыкновенная (*Streptomyces scabies*), фузариоз (*Fusarium* spp).

Против вредителей зернобобовых: клубеньковые долгоносики (*Sitona* spp), проволочники и ложнопроволочники (*Agriotes* spp), тли (*Aphidae* spp), блошки.

Против болезней зернобобовых: плесневение семян (грибы рода *Aspergillum*, *Penicillium* и другие), аскохитоз (*Ascochyta* spp.), антракноз (*Colletotrichum pisi*), фузариоз (*Fusarium* spp.), серая гниль (*Botrytis cinerea*).

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Норма расхода	Вредный объект	Способ, время обработки
Чечевица	1,0 л/т	Блошки, тли	Протравливание семян суспензией препарата. Расход рабочей жидкости - в зависимости от культуры
Картофель	0,2 л/т	Проволочники, колорадский жук, тли-переносчики вирусов, ризоктониоз, фитофтороз, виды парши	Обработка клубней до или во время посадки



ЭЛИРЕН



Действующее вещество:

тебуконазол 60 г/л
мефеноксам 60 г/л



Препаративная форма:
концентрат суспензии (КС)



Упаковка:
5 литров

Инновационный фунгицидный протравитель для обработки семян зерновых культур, против комплекса семенных, почвенных и азрогенных инфекций.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА

- Благодаря тщательно подобранной комбинации двух действующих веществ с разным спектром активности, проявляет высокую эффективность против широкого спектра заболеваний.
- Наличие мефеноксама (системный фунгицид из класса фениламидов) позволяет осуществлять защиту от питиозной корневой гнили.
- Антирезистентная программа: за счет сочетания двух действующих веществ из разных химических классов.

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Зерновые культуры: гельминтоспориозная корневая гниль (*Bipolaris sorociniana*), фузариозная корневая гниль ячменя (*Fusarium graminearum*), твердая головня пшеницы (*Tilletia caries*), пыльная головня пшеницы (*Ustilago nuda* f. sp. tritici), пыльная головня ячменя (*Ustilago nuda* f. sp. hordei), твердая головня ячменя (*Ustilago hordei*).



РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Норма расхода	Вредный объект	Способ, время обработки
Пшеница яровая, ячмень яровой	0,4 л/т	Твердая, каменная, пыльная головня, плесневение семян, корневые гнили	Протравливание семян суспензией препарата. Расход рабочей жидкости - в зависимости от культуры



ЭРИДА



Действующее вещество:
тебуконазол 73 г/л
протиоконазол 107 г/л



Препаративная форма:
концентрат суспензии (КС)



Упаковка:
5 литров

Инновационный фунгицидный протравитель семян зерновых и масличных культур, обладающий пролонгированным защитным и лечебным действием.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА

- Высокая степень защиты семян и проростков от основных заболеваний: пыльная и твердая головня, корневые и прикорневые гнили.
- Отличное обеззараживающее и длительное защитное действие.
- Благодаря ростостимулирующему действию формируется более мощная корневая система: замечено утолщение проростков, увеличивается общая масса корневой системы и ее длина.
- Отличный старт и высокая реализация потенциала урожайности.
- Прекрасный партнер для баковых смесей с инсектицидными протравителями.

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Зерновые культуры: твердая головня пшеницы (*Tilletia caries*), пыльная головня пшеницы (*Ustilago nuda* f. sp. *tritici*), пыльная головня ячменя (*Ustilago nuda* f. sp. *hordei*), каменная головня ячменя (*Ustilago hordei*), фузариозная корневая гниль (*Fusarium* spp.), гельминтоспориозная корневая гниль (*Bipolaris sorociniana*), септориозная пятнистость (*Stagonospora nodorum*), снежная плесень (*Microdochium nivale*), полосатая пятнистость ячменя (*Pyrenophora graminea*), сетчатая пятнистость (*Drechslera teres*), плесневение семян (грибы из рода *Aspergillus*, *Penicillium* и другие).

Масличные культуры: аскохитоз (*Ascochyta* spp.), антракноз (*Colletotrichum pisi*), фузариоз (*Fusarium* spp.), плесневение семян (грибы рода *Aspergillum*, *Penicillium* и другие).

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Норма расхода	Вредный объект	Способ, время обработки
Пшеница яровая, ячмень яровой	0,3 л/т	Пыльная, твердая, каменная головня, плесневение семян, корневые гнили	Протравливание семян суспензией препарата. Расход рабочей жидкости - в зависимости от культуры
Лен масличный	0,3-0,35 л/т	Антракноз, фузариоз, плесневение семян	



БЕЛЛИСИМО



Действующее вещество:
Феноксапроп-п-этил 140 г/л
клоквинтоцет-мексил 50 г/л



Препаративная форма:
эмульсия масляно-водная
(ЭМВ)



Упаковка:
5 литров

Селективный гербицид для послевсходовой обработки пшеницы против широкого спектра злаковых сорняков.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА

- Высокая эффективность против злаковых сорняков.
- Уникальная селективность для обрабатываемых культур.
- Широкое технологическое окно в сроках применения.
- Отличная дождеустойчивость.
- Наиболее широко применяемое во всем мире действующее вещество в борьбе со злаковыми сорняками в посевах зерновых.
- Отсутствие ограничений по севообороту.
- Высокая экономическая эффективность контроля овсяга, просянок, щетинников и других злаковых сорняков.

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

БЕЛЛИСИМО эффективен против однолетних злаковых сорняков: просо виды (*Panicum* spp.), щетинник виды (*Setaria* spp.), куриное просо (*Echinochloa crus-galli*), овсяг обыкновенный (*Avena fatua*), лисохвост мышехвостниковидный (*Alopecurus myosuroides*).

ОГРАНИЧЕНИЯ В СЕВООБОРОТЕ

Не обладает почвенным эффектом. Попадая в почву, происходит быстрое разложение гербицида на биологически неактивные компоненты. Таким образом, ограничений по севообороту для последующих культур не существует.



РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Норма расхода	Вредный объект	Способ, время обработки
Пшеница яровая и озимая	0,4-0,6 л/га	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам не зависимо от фазы развития культуры



БЕЛЛИСИМО 2.0



Действующее вещество:
феноксапроп-п-этил 200 г/л
клоквинтоцет-мексил 40 г/л
(антидот)



Препаративная форма:
концентрат эмульсии (КЭ)



Упаковка:
5 литров

Высокоселективный гербицид для послевсходовой обработки пшеницы против широкого спектра однолетних злаковых сорняков в более концентрированной форме.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА

- Высокая эффективность против широкого спектра однолетних злаковых сорняков.
- Уникальная селективность для обрабатываемых культур за счет антидота.
- Широкое технологическое окно в сроках применения.
- Отличная дождеустойчивость.
- Широко известное во всем мире действующее вещество в концентрированной форме для борьбы со злаковыми сорняками в посевах пшеницы.
- Отсутствие ограничений по севообороту.
- Высокая экономическая эффективность контроля овсюга, просянок, щетинников и других однолетних злаковых сорняков.
- Удобен в применении и хранении благодаря концентрированной форме.

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

БЕЛЛИСИМО 2.0 эффективен против однолетних злаковых сорняков: просо виды (*Panicum spp.*), щетинник виды (*Setaria spp.*), куриное просо (*Echinochloa crus-galli*), овсюг обыкновенный (*Avena fatua*), лисохвост мышехвостниковидный (*Alopecurus myosuroides*).



РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Норма расхода	Вредный объект	Способ, время обработки
Пшеница яровая	0,3-0,45 л/га	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам не зависимо от фазы развития культуры



БЕЛЛИСИМО ЛАЙТ



Действующее вещество:
феноксапроп-п-этил 120 г/л
клоквинтоцет-мексил 23 г/л
(антидот)



Препаративная форма:
концентрат эмульсии (КЭ)



Упаковка:
5 литров

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

эффективен против однолетних злаковых сорных растений: просо куриное (*Echinochloa crus-galli*), просо волосовидное (*Panicum capillare*), щетинник, виды (*Setaria* spp.), овсюг (*Avena fatua*), метлица обыкновенная (*Apera spicaventi*), лисохвост полевой (*Alopecurus myosuroides*), мятлик однолетний (*Poa annua*), росичка кроваво-красная (*Digitaria sanguinalis*) и др.

Высокоселективный гербицид для послевсходовой обработки пшеницы против широкого спектра однолетних злаковых сорняков.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА

- Высокая эффективность контроля злаковых сорняков.
- Высокоселективен к обрабатываемой культуре.
- Широкий диапазон сроков применения, независимо от фазы развития культуры.
- Совместимость в баковых смесях с противодвудольными гербицидами.
- Возможно применение в баковых смесях с фунгицидами, инсектицидами, регуляторами роста и жидкими удобрениями, применяемыми на зерновых культурах.
- За счет уменьшения концентрации действующих веществ, удалось увеличить количество вспомогательных веществ (прилипатель, антивспениватель и т.д).
- Высокая дождеустойчивость, небольшие осадки, прошедшие через два часа после обработки, не снижают эффективность препарата.
- После обработки рост и развитие сорняка останавливается, прекращается потребление питательных веществ и влаги из почвы, тем самым снимается конкуренция перед

ОГРАНИЧЕНИЯ В СЕВООБОРОТЕ

Не обладает почвенным эффектом. Попадая в почву, происходит быстрое разложение гербицида на биологически неактивные компоненты. Таким образом, ограничений по севообороту для последующих культур не существует.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Норма расхода	Вредный объект	Способ, время обработки
Пшеница яровая	0,3-0,5 л/га	Просо (виды), щетинники	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам не зависимо от фазы развития культуры
	0,5-0,75 л/га	Просо (виды), овсюг, щетинники	



БРЭМБО



Действующее вещество:
дикамба 60 г/л
2,4-Д эфир 552 г/л



Препаративная форма:
концентрат эмульсии (КЭ)



Упаковка:
5 литров

Комбинированный двухкомпонентный гербицид для защиты зерновых культур против широкого спектра однолетних и многолетних двудольных сорных растений.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА

- Идеальная комбинация двух действующих веществ с разным механизмом действия для эффективного контроля сорняков.
- Высокая эффективность против широкого спектра двудольных сорных растений (более 200 видов).
- Быстрое и длительное действие благодаря системности препарата.
- Готовый препарат к применению – баковые смеси не нужны.
- Нет ограничений по последдействию в севообороте.
- Быстрое проявление симптомов действия препарата (на 2-3 сутки после применения).

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

БРЭМБО эффективен против двудольных сорняков: бодяк полевой (*Cirsium arvense*), осот огородный (*Sonchus oleraceus*), осот шероховатый (*Sonchus asper*), лебеда раскидистая (*Atriplex patula*), вьюнок полевой* (*Convolvulus arvensis*), молочай лозный (*Euphorbia waldesteinii*), полынь горькая* (*Artemisia absinthium*), полынь обыкновенная* (*Artemisia vulgaris*), горцы виды (*Polygonum spp.*), горчица полевая (*Sinapis arvensis*), курай-солянка русская (*Salsola australis*), латук-молокан татарский (*Lactuca tatarica*), мать белая (*Chenopodium album*), пастушья сумка (*Capsella bursa-pastoris*), ромашка виды (*Matricaria spp.*), щирица запрокинутая (*Amaranthus retroflexus*), ярутка полевая (*Thlaspi arvense*), осот полевой, желтый (*Sonchus arvensis*), гречишка татарская (*Fagopyrum tataricum*), лебеда виды (*Atriplex spp.*), одуванчик лекарственный (*Taraxacum officinale*), сурепка обыкновенная (*Barbarea vulgaris*), чина (*Lathyrus spp.*), падалица подсолнечника (*Helianthus annuus*), падалица рапса (*Brassica napus*), паслен черный (*Solanum nigrum*), щавель курчавый (*Rumex crispus*) и др.

При наличии в посевах отмеченных сорных растений (*) необходимо использовать гербицид в максимальной норме расхода и на ранних этапах развития сорняка.

ОГРАНИЧЕНИЯ В СЕВОБОРОТЕ

В случае применения гербицида БРЭМБО в рекомендуемых нормах расхода ограничения по севообороту отсутствуют. На следующий год можно высевать любые бобовые и масличные культуры.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Норма расхода	Вредный объект	Способ, время обработки
Пшеница яровая, озимая	0,3-0,5 л/га	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры



ДИСКАТОР ФОРТЕ



Действующее вещество:

флорасулам 5 г/л
флуроксипир 50 г/л
2,4-Д кислота
в виде сложного эфира 410 г/л



Препаративная форма:
концентрат эмульсии (КЭ)



Упаковка:
20 литров

Уникальный трехкомпонентный гербицид системного действия для применения в посевах зерновых колосовых культур для борьбы с однолетними и многолетними двудольными сорняками.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА

- Единственный в своем роде.
- Все три действующих вещества гербицида ДИСКАТОР ФОРТЕ обладают системной активностью.
- Дифференцированные механизмы действия 2,4-Д, флуроксипира и флорасулама определяют ярко выраженный синергетический эффект против трудноискоренимых сорняков.
- Быстрота действия благодаря наличию в составе эфира 2,4-Д и флуроксипира в сочетании с высокой селективностью к культуре флорасулама.
- Не требует гербицидов-партнеров для расширения контролируемого спектра сорняков.

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

ДИСКАТОР ФОРТЕ эффективен против однолетних и многолетних двудольных сорняков: вьюнок полевой (*Convolvulus arvensis*), молочай лозный (*Euphorbia waldsteinii*), бодяк полевой (*Cirsium arvensis*), осот огородный (*Sonchus oleraceus*), горцы виды (*Polygonum spp.*), горчица полевая (*Sinapis arvensis*), курай-солянка русская (*Salsola australis*), подмаренник цепкий (*Galium aparine*), латук-молочан татарский (*Lactuca tatarica*), марь белая (*Chenopodium album*), пастушья сумка (*Capsella-bursa pastoris*), ромашка виды (*Matricaria spp.*), щирица запрокинутая (*Amaranthus retroflexus*), ярутка полевая (*Thlaspi arvensis*), осот полевой, желтый (*Sonchus arvensis*), гречишка татарская (*Fagopyrum tataricum*), лебеда виды (*Atriplex spp.*), одуванчик лекарственный (*Taraxacum officinale*), яснотка, виды (*Lamium spp.*), сурепка обыкновенная (*Barbarea vulgaris*), чина (*Lathyrus spp.*) и т. д.

ОГРАНИЧЕНИЯ В СЕВООБОРОТЕ

Благодаря быстрому разложению в почве не существует, при обычной ротации в севообороте, ограничений для ДИСКАТОР ФОРТЕ в отношении последующих озимых и яровых культур, включая чувствительные масличные и бобовые культуры.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Норма расхода	Вредный объект	Способ, время обработки
Пшеница и ячмень яровые	0,3-0,4 л/га	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры



КАНОНИР 3.0



Действующее вещество:
амидосульфурон 350 г/кг
тифенсульфурон 350 г/кг
метсульфурон-метил 50 г/кг



Препаративная форма:
водно-диспергируемые
гранулы (ВДГ)



Упаковка:
500 грамм

Селективный гербицид для защиты посевов зерновых колосовых культур и льна масличного от однолетних и многолетних двудольных сорняков.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА

- Уникальное сочетание 3-х действующих веществ в препарате, обеспечивающих высокую эффективность против однолетних и многолетних двудольных сорняков.
- Обеспечивает тройную защиту против более чем 60 видов широколистных сорняков произрастающих в посевах зерновых культур и льна масличного.
- Непревзойденный контроль трудноконтролируемых сорняков (подмаренник цепкий, марь белая, вьюнок, виды бодяков и т.д.) благодаря наличию амидосульфурона.
- Высокая селективность на культуру.
- Не имеет ограничений в севообороте с зерновыми колосовыми культурами и льном.

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

КАНОНИР 3.0 эффективен против однолетних и многолетних двудольных сорняков: бодяк полевой (*Cirsium arvense*), осот огородный (*Sonchus oleraceus*), осот шероховатый (*Sonchus asper*), лебеда раскидистая (*Atriplex patula*), вьюнок полевой* (*Convolvulus arvensis*), молочай лозный* (*Euhorbia waldsteinii*), горцы виды (*Polygonum spp.*), горчица полевая (*Sinapis arvensis*), курай-солянка русская (*Salsola australis*), подмаренник цепкий (*Galium aparine*), латук-молокан татарский (*Lactuca tatarica*), марь белая (*Chenopodium album*), пастушья сумка (*Capsella bursa pastoris*), ромашка виды (*Matricaria spp.*), щирица запрокинутая (*Amaranthus retroflexus*), ярутка полевая (*Thlaspi arvense*), осот полевой, желтый (*Sonchus arvensis*), гречишка татарская (*Fagopyrum tataricum*), лебеда виды (*Atriplex spp.*), одуванчик лекарственный (*Taraxacum officinale*), яснотка, виды (*Lamium spp.*), сурепка обыкновенная (*Barbarea vulgaris*), чина (*Lathyrus spp.*), подсолнечник (*Helianthus annus*), падалица рапса (*Brassica napus*), паслен черный (*Solanum nigrum*) и др.

При наличии в посевах отмеченных сорных растений (*) необходимо использовать гербицид в максимальной норме расхода и на ранних этапах развития сорняка.

ОГРАНИЧЕНИЯ В СЕВОБОРОТЕ

Препарат рекомендуется использовать в севообороте на льне с последующими зерновыми колосовыми культурами и, наоборот, на зерновых колосовых с последующим за ними льном. На следующий год после обработки не рекомендуется проводить посев таких культур, как рапс яровой и озимый, подсолнечник, овощные, бахчевые, бобовые.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Норма расхода	Вредный объект	Способ, время обработки
Пшеница яровая, ячмень яровой	20 - 25 г/га	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание в фазе кущения культуры
Лен масличный			Опрыскивание посевов льна в фазу «ёлочки» культуры



КАСКАД



Действующее вещество:
трибенурон-метил 750 г/кг



Препаративная форма:
водно-диспергируемые
гранулы (ВДГ)



Упаковка:
500 грамм

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Однолетние и многолетние
двудольные сорняки.

Высокоселективный системный гербицид для послевсходовой борьбы с однолетними и многолетними двудольными сорняками в посевах подсолнечника, устойчивого к трибенурон-метилу.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА

- Широкий спектр контролируемых сорняков, эффективен против более ста видов сорных растений.
- Уничтожает сорняки-конкуренты и обеспечивает подсолнечнику хороший старт и последующее развитие.
- Благодаря послевсходовому применению эффективность не зависит от влажности почвы.
- Действующее вещество не накапливается в окружающей среде, быстро разлагается в почве.
- Прекрасный партнер для баковых смесей с граминцидами.
- Не имеет ограничений по севообороту.



ОГРАНИЧЕНИЯ В СЕВООБОРОТЕ

Благодаря быстрому разложению в почве, на следующий год можно высевать любую культуру в севообороте. Масличные культуры как рапс, лен, подсолнечник, сафлор можно пересевать по истечении 60 дней после обработки КАСКАД.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Норма расхода	Вредный объект	Способ, время обработки
Подсолнечник (устойчивый к трибенурон-метилу)	30 г/га + ПАВ	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу культуры от 2-8 листьев и ранние фазы роста сорняков



КАСКАД ПРЕМИУМ



Действующее вещество:
трибенурон-метил 410 г/кг
тифенсульфурон-метил 140 г/кг
флорасулам 200 г/кг



Препаративная форма:
водно-диспергируемые
гранулы (ВДГ)



Упаковка:
500 грамм

Высокоэффективный трёхкомпонентный гербицид широкого спектра действия для борьбы с однолетними и многолетними двудольными сорняками в посевах яровой пшеницы и ярового ячменя.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА

- Лучшее решение для антирезистентной защиты благодаря комбинации 3-х молекул.
- Широкий спектр контролируемых сорняков в том числе осотов, бодяков, молочая лозного, подмаренника цепкого и др. в посевах зерновых культур.
- Широкий диапазон сроков применения.
- Не требователен к температурному режиму. Работает начиная с 5 °С.
- Не имеет ограничений по севообороту.
- Минимальная пестицидная нагрузка на почву и окружающую среду.

ОГРАНИЧЕНИЯ В СЕВООБОРОТЕ

Благодаря быстрому разложению в почве, на следующий год можно высевать любую культуру в севообороте. Масличные культуры как рапс, лен, подсолнечник, сафлор можно пересевать по истечении 60 дней после обработки КАСКАД ПРЕМИУМ.



РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Норма расхода	Вредный объект	Способ, время обработки
Пшеница яровая, ячмень яровой	10-20 г/га + ПАВ	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры



КАСКАД ПРО



Действующее вещество:
трибенурон-метил 600 г/кг
флорасулам 150 г/кг



Препаративная форма:
водно-диспергируемые
гранулы (ВДГ)



Упаковка:
500г грамм



Высокоселективный системный гербицид для послевсходовой борьбы с однолетними и многолетними двудольными сорняками в посевах зерновых культур.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА

- Комбинация 2-х молекул разных химических классов – отличный инструмент антирезистентной защиты культур.
- Максимально селективен к обрабатываемым культурам за счет оптимального подбора компонентов препарата.
- Широкий спектр контролируемых сорняков, в том числе осотов, бодяков, молочая лозного и др. в посевах зерновых культур за счёт тщательно сбалансированного состава.
- Оптимальное решение проблем с подмаренником цепким в широком интервале стадий его развития.
- Широкое технологическое окно в сроках применения.
- Возможность применения в широком диапазоне температур окружающей среды и различных режимах увлажнения.
- Полное отсутствие ограничений для последующих культур севооборота.
- Минимальная пестицидная нагрузка на почву и окружающую среду.
- Низкие нормы расхода и быстрый период распада в почве.
- Отличный партнер для баковых смесей в системе комплексной защиты культур.

СКОРОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Активный рост чувствительных сорных растений и конкуренция с культурой прекращается в течение 1-2 часов после обработки КАСКАД ПРО. В первые 4-7 дней происходит пожелтение листьев восприимчивых сорняков, через 9-12 дней образуются хлоротические пятна и отмирают точки роста, а гибель происходит в течение 2-3 недель после опрыскивания. Максимально быстрый гербицидный эффект достигается при обработке на ранних стадиях развития чувствительных малолетних двудольных и в фазе розетки многолетних корнеотпрысковых сорных растений, а также при благоприятных условиях роста: оптимальной влажности и температуре.

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

КАСКАД ПРО эффективен против однолетних и многолетних двудольных сорняков: бодяк полевой (*Cirsium arvense*), осот полевой желтый (*Sonchus arvensis*) осот шероховатый (*Sonchus asper*), лебеда раскидистая (*Atriplex patula*), вьюнок полевой* (*Convolvulus arvensis*), молочай лозный* (*Euhorbia waldesteinii*), горцы виды (*Polygonum spp.*), горчица полевая (*Sinapis arvensis*), курай - солянка русская (*Salsola australis*), подмаренник цепкий (*Galium aparine*), латук-молокан татарский (*Lactuca tatarica*), марь белая (*Chenopodium album*), пастушья сумка (*Capsella bursa pastoris*), ромашка виды (*Matricaria spp.*), щирица запрокинутая (*Amaranthus retroflexus*), ярутка полевая (*Thlaspi arvense*), гречишка татарская (*Fagopyrum tataricum*), лебеда виды (*Atriplex spp.*), одуванчик лекарственный (*Taraxacum officinale*), яснотка, виды (*Lamium spp.*), сурепка обыкновенная (*Barbarea vulgaris*), чина (*Lathyrus spp.*), падалица подсолнечника (*Helianthus annuus*), падалица рапса (*Brassic napus*), паслен черный (*Solanum nigrum*), щавель курчавый (*Rumex crispus*), яснотка, виды (*Lamium spp.*) и др.

При наличии в посевах сорных растений отмеченных (*) необходимо использовать гербицид в максимальной норме расхода или в баке с 2,4-Д на ранних этапах развития сорняка.



ОГРАНИЧЕНИЯ В СЕВОБОРОТЕ

Благодаря быстрому разложению в почве, при обычной ротации в севообороте, ограничений для КАСКАД ПРО в отношении последующих озимых и яровых культур включая чувствительные масличные и бобовые культуры нет.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Норма расхода	Вредный объект	Способ, время обработки
Пшеница яровая, ячмень яровой	10 – 20 г/га + ПАВ	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов с фазы 3-х листьев до фазы 2-го междоузлия



КАСКАД ФОРТЕ



Действующее вещество:
трибенурон-метил 375 г/кг
тифенсульфурон-метила 375 г/кг



Препаративная форма:
водно-диспергируемые
гранулы (ВДГ)



Упаковка:
500 грамм

Селективный системный гербицид для после-всходового контроля однолетних и некоторых многолетних двудольных сорняков в посевах зерновых культур.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА

- Эффективная защита от комплекса однолетних и многолетних двудольных сорняков.
- Сочетание обеих молекул позволяет расширить спектр действия и эффективно подавлять наиболее злостные однолетние и многолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к гербицидам группы 2,4-Д.
- Высокая селективность к культуре и широкий диапазон сроков применения.
- Прекрасный партнер для баковых смесей.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО СЕВОБОРОТУ

КАСКАД ФОРТЕ быстро разлагается в почве, осенью после уборки ячменя или пшеницы и весной следующего года можно высевать любые культуры. В случае гибели, по каким-либо причинам, посевов зерновых, обработанных гербицидом КАСКАД ФОРТЕ, зерновые можно пересевать только яровыми зерновыми.



РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Норма расхода	Вредный объект	Способ, время обработки
Пшеница и ячмень яровые	25 – 35 г/га + ПАВ	Однолетние и многолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев до выхода в трубку
Пшеница озимая	25 – 35 г/га + ПАВ	Однолетние и многолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев до выхода в трубку



КАСКАД ЭКСПРЕСС



Действующее вещество:
трибенурон-метил 670 г/кг
тифенсульфурон-метил 80 г/кг



Препаративная форма:
водно-диспергируемые
гранулы (ВДГ)



Упаковка:
500 грамм

Высокоселективный системный гербицид для послевсходовой борьбы с однолетними и многолетними двудольными сорняками в посевах подсолнечника, устойчивого к трибенурон-метилу и тифенсульфурон-метилу.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА

- Широкий диапазон сроков применения.
- Отсутствие ограничений в севообороте (бобовые и масличные культуры).
- Высокая селективность к обрабатываемым культурам.
- Максимально широкий спектр действия против двудольных сорняков.
- Хороший партнер для баковых смеси с граминицидами: отсутствие антагонизма и проявление синергизма на просовидные сорняки.

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Эффективен против однолетних и многолетних двудольных сорняков: бодяк полевой (*Cirsium arvense*), осот огородный (*Sonchus oleraceus*), осот шероховатый (*Sonchus asper*), лебеда раскидистая (*Atriplex patula*), вьюнок полевой* (*Convolvulus arvensis*), молочай лозный* (*Euphorbia waldsteinii*), горцы виды (*Polygonum spp.*), горчица полевая (*Sinapis arvensis*), курай-солянка русская (*Salsola australis*), подмаренник цепкий (*Galium aparine*), латук-молокан татарский (*Lactuca tatarica*), марь белая (*Chenopodium album*), пастушья сумка (*Capsella-bursa pastoris*), ромашка виды (*Matricaria spp.*), щирица запрокинутая (*Amaranthus retroflexus*), ярутка полевая (*Thlaspi arvense*), осот полевой, желтый (*Sonchus arvensis*), гречишка татарская (*Fagopyrum tataricum*), лебеда виды (*Atriplex spp.*), одуванчик лекарственный (*Taraxacum officinale*), яснотка, виды (*Lamium spp.*), сурепка обыкновенная (*Barbarea vulgaris*), чина (*Lathyrus spp.*), падалица подсолнечника (*Helianthus annuus*), падалица рапса (*Brassica napus*), паслен черный (*Solanum nigrum*), щавель курчавый (*Rumex crispus*), яснотка, виды (*Lamium spp.*) и др.

При наличии в посевах отмеченных сорных растений (*) необходимо использовать гербицид в максимальной норме расхода и на ранних этапах развития сорняка.

ОГРАНИЧЕНИЯ В СЕВООБОРОТЕ

Благодаря быстрому разложению в почве не существует, при обычной ротации в севообороте ограничений для КАСКАД ЭКСПРЕСС в отношении последующих озимых и яровых культур. В случае гибели посевов по каким либо причинам, можно пересевать яровые зерновые сразу после обработки посевов КАСКАД ЭКСПРЕСС. Масличные культуры как рапс, лен, подсолнечник, сафлор можно пересевать по истечении 60 дней после обработки КАСКАД ЭКСПРЕСС.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Норма расхода	Вредный объект	Способ, время обработки
Подсолнечник (устойчивый к трибенурон – метилу и тифенсульфурон – метилу)	30 г/га + ПАВ	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу культуры от 2-8 листьев и ранние фазы роста сорняков



КАССАР ПРО



Действующее вещество:
метсульфурон-метил 390 г/кг
амидосульфурон 100 г/кг
трибенурон-метил 260 г/кг



Препаративная форма:
водно-диспергируемые
гранулы (ВДГ)



Упаковка:
500 грамм

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

КАССАР ПРО эффективен против однолетних и многолетних двудольных сорняков: бодяк полевой (*Cirsium arvense*), осот огородный (*Sonchus oleraceus*), осот шероховатый (*Sonchus asper*), лебеда раскидистая (*Atriplex patula*), вьюнок полевой* (*Convolvulus arvensis*), молочай лозный*

(*Euphorbia waldsteinii*), горцы виды (*Polygonum spp.*), горчица полевая (*Sinapis arvensis*), курай-солянка русская (*Salsola australis*), подмаренник цепкий (*Galium aparine*), латук-молокан татарский (*Lactuca tatarica*), марь белая (*Chenopodium album*), пастушья сумка (*Capsella-bursa pastoris*), ромашка виды (*Matricaria spp.*), щирица запрокинутая (*Amaranthus retroflexus*), ярутка полевая (*Thlaspi arvense*), осот полевой, желтый (*Sonchus arvensis*), гречишка татарская (*Fagopyrum tataricum*), лебеда виды (*Atriplex spp.*), одуванчик лекарственный (*Taraxacum officinale*), яснотка, виды (*Lamium spp.*), сурепка обыкновенная (*Barbarea vulgaris*), чина (*Lathyrus spp.*), падалица подсолнечника (*Helianthus annuus*), падалица рапса (*Brassica napus*), паслен черный (*Solanum nigrum*), щавель курчавый (*Rumex crispus*), яснотка, виды (*Lamium spp.*) и др.

При наличии в посевах отмеченных сорных растений (*) необходимо использовать гербицид на ранних этапах развития сорняка в максимальной норме расхода или в баке с препаратами на основе 2,4 – Д, МЦПА, дикамбы и т.д.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА

- Оригинальная комбинация трёх наиболее эффективных молекул обеспечивает максимальный гербицидный эффект среди гербицидов класса сульфонилмочевин.
- Максимально расширенный спектр гербицидного воздействия на двудольные сорняки как результат оптимального подбора и количественного баланса высокосистемных действующих веществ.
- Мощная сбалансированная защита культур в рамках антирезистентной стратегии.
- Максимально селективен к обрабатываемым культурам за счет оптимального подбора компонентов препарата.
- Широкое технологическое окно в сроках применения.
- Возможность применения в широком диапазоне температур окружающей среды и различных режимах увлажнения.
- Отличный партнер для баковых смесей, как в системе комплексной защиты культур так и в рамках борьбы против трудноискоренимых сорняков.

ОГРАНИЧЕНИЯ В СЕВОБОРОТЕ

В отношении последующих в севообороте зерновых культур ограничений для применения КАССАР ПРО не существует. На следующий год после применения нельзя высевать чувствительные к сульфонилмочевинам культуры – свеклу и овощные. Гречиху, рапс, подсолнечник, зернобобовые культуры рекомендуется высевать после проведения глубокой осенней вспашки. При необходимости пересева площадей, обработанных КАССАР ПРО, рекомендуется высевать только яровые зерновые культуры.



РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Норма расхода	Вредный объект	Способ, время обработки
Пшеница яровая, ячмень яровой	6 – 8 г/га	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов с фазы 3-х листьев до фазы 2-го междоузлия.



КИНЕТИК



Действующее вещество:
клетодим 240 г/л



Препаративная форма:
концентрат эмульсии (КЭ)



Упаковка:
5 литров

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Овсяг, виды (*Avena* spp.); просо, виды (*Panicum* spp.); куриное просо (*Echinochloa crusgalli*); лисохвост мышехвостниковидный (*Alopecurus myosuroides*); щетинник, виды (*Setaria* spp.); пырей ползучий (*Agropyron repens*), острец (*Aropyrum ramosum* Richt); видов костра (*Bromus* spp.); падалицы пшеницы (*Triticum* spp.); падалицы ячменя и других злаковых культур.

Послевсходовый системный гербицид для борьбы с однолетними и многолетними злаковыми сорняками в посевах масличных и бобовых культур.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА

- Эффективно контролирует все виды одолетних и многолетних злаковых сорняков.
- Быстро распадается на неактивные элементы под действием температуры и солнечного света. Период полураспада составляет 1-3 дня.
- Незаменим при использовании против переросших злаковых сорняков и высокой засоренности посевов.
- Универсален в применении на масличных, бобовых и технических культурах.
- Отсутствие фитотоксичности в любую фазу развития культур.
- Быстрое проникновение и стабильность результатов независимо от условий применения продукта.
- Превосходное системное действие уничтожает не только надземную, но и корневую систему злаковых сорняков.
- Минимальный уровень опасности для пчел (класс 3). Не имеет ограничений при использовании в водоохраных зонах.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Норма расхода	Вредный объект	Способ, время обработки
Рапс, лен, подсолнечник	0,15-0,2 л/га + ПАВ	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в период вегетации
	0,3-0,4 л/га + ПАВ	Многолетние злаковые сорняки, включая пырей ползучий	
Горчица, гречиха, чечевица, горох, соя	0,15-0,4 л/га + ПАВ	Однолетние и многолетние злаковые сорняки, включая пырей ползучий	



КИНЕТИК ЛАЙТ



Действующее вещество:
клетодим 120 г/л



Препаративная форма:
концентрат эмульсии (КЭ)



Упаковка:
5 литров

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Эффективен против широкого спектра злаковых сорняков: овсюг, виды (*Avena* spp.); просо, виды (*Panicum* spp.); куриное просо (*Echinochloa crus-galli*); лисохвост (*Alopecurus myosuroides*); щетинник, виды (*Setaria* spp.); пырей ползучий (*Agropyron repens*), острец (*Agropyrum ramosum-Richt*); видов костра (*Bromus* spp.); падалицы пшеницы (*Triticum* spp); падалицы ячменя и других злаковых культур.

После всходов системный гербицид для борьбы с однолетними и многолетними злаковыми сорняками в посевах масличных, бобовых культур, а так же гречихи.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА

- Эффективно контролирует все виды однолетних и многолетних злаковых сорняков.
- Быстро распадается на неактивные элементы под действием температуры и солнечного света. Период полураспада составляет 1-3 дня.
- Незаменим при использовании против переросших злаковых сорняков и высокой засоренности посевов.
- Универсален в применении на масличных, бобовых и технических культурах.
- Отсутствие фитотоксичности в любую фазу развития культур. Быстрое проникновение и стабильность результатов в широком диапазоне погодных условий применения продукта.
- Превосходное системное действие: уничтожает не только надземную, но и корневую систему злаковых сорняков.
- Минимальный уровень опасности для пчел (класс 3). Не имеет ограничений при использовании в природоохраненных зонах.

ОГРАНИЧЕНИЯ В СЕВООБОРОТЕ

После применения препарата КИНЕТИК ЛАЙТ может быть посеяна любая широколистная культура без ограничений. Пересев зерновыми культурами в сезон применения препарата возможен только после проведения вспашки. На следующий сезон – без ограничений.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Норма расхода	Вредный объект	Способ, время обработки
Рапс, горчица, лён масличный, подсолнечник, горох, соя, чечевица, гречиха	0,5-0,7 л/га	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев сорняков, независимо от фазы культуры
	0,8-1 л/га	Многолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-20 см., независимо от фазы культуры



КИНЕТИК ФОРТЕ



Действующее вещество:
клетодим 137 г/л
хизалофоп-п-этил 73 г/л



Препаративная форма:
концентрат эмульсии (КЭ)



Упаковка:
5 литров

Высокоэффективный двухкомпонентный гербицид широкого спектра действия для борьбы с однолетними и многолетними злаковыми сорняками в посевах масличных и зернобобовых культур.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА

- Высокая эффективность на однолетние и многолетние злаковые сорняки благодаря синергизму действия 2-х действующих веществ с разным механизмом действия.
- Универсален при применении на бобовых, масличных и технических культурах.
- Высокое системное действие, уничтожает не только надземную, но и корневую систему сорняков.
- Отсутствие фитотоксичности в любую фазу развития культур.

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Эффективен против широкого спектра злаковых сорняков: овсюг, виды (*Avena* spp.); просо, виды (*Panicum* spp.); куриное просо (*Echinochloa crus-galli*); лисохвост мышехвостниковидный (*Alopecurus myosuroides*); щетинник, виды (*Setaria* spp.); пырей ползучий (*Agropyron repens*), острец (*Агropyrum ramosum* Richt); видов коостра (*Bromus* spp.); падалицы пшеницы (*Triticum* spp); падалицы ячменя и других злаковых культур.

ОГРАНИЧЕНИЯ В СЕВОБОРОТЕ

Клетодим и хизалофоп-п-этил быстро разлагаются в почве. На следующий год можно высевать любую культуру в севообороте.



РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Норма расхода	Вредный объект	Способ, время обработки
Чечевица, лен масличный, рапс, подсолнечник	0,3-0,4 л/га	Однолетние и многолетние злаковые сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста



ЛЕГГЕРО ФОРТЕ



Действующее вещество:
клодинафоп-пропаргил 240 г/л
клоквинтоцет-мексил 60 г/л
(антидот)



Препаративная форма:
концентрат эмульсии (КЭ)



Упаковка:
5 литров

Высокоселективный гербицид для послевсходовой обработки пшеницы против широкого спектра злаковых сорняков.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА

- Высокая концентрация действующего вещества, низкая норма расхода.
- Идеальный инструмент для контроля смешанных популяций однолетних злаковых сорняков в посевах пшеницы.
- Широкое технологическое окно по срокам применения.
- Высокая селективность к обрабатываемой культуре.
- Современная и практичная формуляция – стабильность в баковых смесях, стабильность при хранении.
- В баковых смесях способствует увеличению эффективности противодвудольных гербицидов.

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

ЛЕГГЕРО ФОРТЕ эффективен против однолетних злаковых сорняков: овсюг обыкновенный (*Avena fatua*), просо виды* (*Panicum spp.*), щетинник виды* (*Setaria spp.*); куриное просо* (*Echinochloa crus-galli*).

При наличии в посевах отмеченных сорных растений (*) необходимо использовать гербицид в максимальной норме расхода и на ранних этапах развития сорняка.



РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Норма расхода	Вредный объект	Способ, время обработки
Пшеница яровая	0,15-0,25 л/га	Однолетние злаковые сорняки (овсюг, просо куриное, виды щетинника)	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам независимо от фазы развития культуры



МАГЕЛЛАН



Действующее вещество:
трибенурон-метил 500 г/кг
амидосульфурон 250 г/кг



Препаративная форма:
водно-диспергируемые
гранулы (ВДГ)



Упаковка:
500 грамм

Послевсходовый системный гербицид для защиты посевов зерновых культур против двудольных сорных растений.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА

- Широкий спектр действия на двудольные сорняки благодаря наличию двух д.в.
- Эффективная защита от комплекса однолетних и многолетних двудольных сорняков.
- Непревзойденный контроль подмаренника цепкого и видов ромашки.
- Нет ограничений в севообороте возделываемых культур.
- Высокая селективность к культуре и широкий диапазон сроков применения.
- Прекрасный партнер для баковых смесей, против трудноискоренимых сорняков.

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

МАГЕЛЛАН эффективен против однолетних и многолетних двудольных сорняков: бодяк полевой (*Cirsium arvense*), осот огородный (*Sonchus oleraceus*), осот шероховатый (*Sonchus asper*), лебеда раскидистая (*Atriplex patula*), вьюнок полевой* (*Convolvulus arvensis*), молочай лозный* (*Euhorbia waldsteinii*), горцы виды (*Polygonum spp.*), горчица полевая (*Sinapis arvensis*), курай-солянка русская (*Salsola australis*), подмаренник цепкий (*Galium aparine*), латук-молокан татарский (*Lactuca tatarica*), марь белая (*Chenopodium album*), пастушья сумка (*Capsella-bursa pastoris*), ромашка виды (*Matricaria spp.*), щирица запрокинутая (*Amaranthus retroflexus*), ярутка полевая (*Thlaspi arvense*), осот полевой, желтый (*Sonchus arvensis*), гречишка татарская (*Fagopyrum tataricum*), лебеда виды (*Atriplex spp.*), одуванчик лекарственный (*Taraxacum officinale*), яснотка, виды (*Lamium spp.*), сурепка обыкновенная (*Barbarea vulgaris*), чина (*Lathyrus spp.*), подсолнечник (*Helianthus annuus*), падалица рапса (*Brassica napus*), паслен черный (*Solanum nigrum*) и др.

При наличии в посевах отмеченных сорных растений (*) необходимо использовать гербицид в максимальной норме расхода и на ранних этапах развития сорняка.

ОГРАНИЧЕНИЯ В СЕВООБОРОТЕ

Благодаря быстрому разложению в почве, при обычной ротации, для МАГЕЛЛАН в отношении последующих озимых и яровых культур не существует ограничений в севообороте. В случае гибели посевов по каким-либо причинам, можно пересевать яровые зерновые сразу после обработки посевов МАГЕЛЛАН. Масличные и бобовые культуры такие как рапс, лен, подсолнечник, сафлор, горох, чечевица, соя можно высевать на следующий год после проведения предварительной осенней механической обработки почвы.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Норма расхода	Вредный объект	Способ, время обработки
Пшеница яровая, ячмень яровой	10-20 г/га + ПАВ	Однолетние и многолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к 2,4-Д	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры



МАГЕЛЛАН ФОРТЕ



Действующее вещество:
трибенурон-метил 450 г/кг
амидосульфурон 210 г/кг
флорасулам 90 г/кг



Препаративная форма:
водно-диспергируемые
гранулы (ВДГ)



Упаковка:
500 грамм

Высокоэффективный трехкомпонентный послевсходовый гербицид системного действия для защиты посевов зерновых культур против широкого спектра однолетних и многолетних двудольных сорных растений.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА

- Широкий спектр действия на двудольные сорняки благодаря наличию трёх д.в.
- Эффективная защита от комплекса однолетних и многолетних двудольных сорняков.
- Непревзойденный контроль подмаренника цепкого и видов ромашки.
- Нет ограничений в севообороте возделываемых культур.
- Высокая селективность к культуре и широкий диапазон сроков применения.
- Прекрасный партнер для баковых смесей, против трудноискоренимых сорняков.

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

МАГЕЛЛАН ФОРТЕ эффективен против однолетних и многолетних двудольных сорняков: бодяк полевой (*Cirsium arvense*), осот огородный (*Sonchus oleraceus*), осот шероховатый (*Sonchus asper*), лебеда раскидистая (*Atriplex patula*), вьюнок полевой* (*Convolvulus arvensis*), молочай лозный* (*Euhorbia waldsteinii*), горцы виды (*Polygonum* spp.), горчица полевая (*Sinapis arvensis*), курай-солянка русская (*Salsola australis*), подмаренник цепкий (*Galium aparine*), латук-молокан татарский (*Lactuca tatarica*), марь белая (*Chenopodium album*), пастушья сумка (*Capsella-bursa pastoris*), ромашка виды (*Matricaria* spp.), щирица запрокинутая (*Amaranthus retroflexus*), ярутка полевая (*Thlaspi arvense*), осот полевой, желтый (*Sonchus arvensis*), гречишка татарская (*Fagopyrum tataricum*), лебеда виды (*Atriplex* spp.), одуванчик лекарственный (*Taraxacum officinale*), яснотка, виды (*Lamium* spp.), сурепка обыкновенная (*Barbarea vulgaris*), чина (*Lathyrus* spp.), падалица подсолнечника (*Helianthus annuus*), падалица панча (*Brassica napus*), паслен черный (*Solanum nigrum*), щавель курчавый (*Rumex crispus*), яснотка, виды (*Lamium* spp.) и др.

При наличии в посевах отмеченных сорных растений (*) необходимо использовать гербицид в максимальной норме расхода и на ранних этапах развития сорняка.

ОГРАНИЧЕНИЯ В СЕВОБОРОТЕ

В случае пересева посевов по каким-либо причинам в год применения гербицида МАГЕЛЛАН ФОРТЕ, рекомендуется высевать зерновые культуры. Масличные и бобовые культуры такие как рапс, лен, подсолнечник, сафлор, горох, чечевица, соя можно высевать на следующий год после проведения предварительной осенней механической обработки почвы.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Норма расхода	Вредный объект	Способ, время обработки
Пшеница яровая, ячмень яровой	15-25 г/га + ПАВ	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры



МАХАОН ПРО



Действующее вещество:
римсульфурон 35 г/кг
никоссульфурон 120 г/кг
мезотрион 370 г/кг



Препаративная форма:
водно-диспергируемые
гранулы (ВДГ)



Упаковка:
5 кг

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМИ ПЕСТИЦИДАМИ

МАХАОН ПРО совместим с большей частью применяемых препаратов на основе атразина, тербутилазина, метолахлола, сулькотриона, дикамбы, бромксинила, пиридата, метосулама. Однако, в каждом случае необходима предварительная проверка на химическую совместимость смешиваемых компонентов. Не смешивать с удобрениями!



Послевсходовый гербицид для контроля однолетних и многолетних злаковых и двудольных сорных растений в посевах кукурузы.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА

- Гербицид кросс-спектра, технологическая оперативность за счёт одновременного контроля однолетних и многолетних злаковых и двудольных сорняков.
- Дополнительные экономические преимущества за счет экономии топлива, снижения стоимости оплаты труда, амортизации техники и т.д.
- Гарантированное уничтожение и максимальный контроль самого широкого спектра однолетних и многолетних злаковых и двудольных сорняков, в том числе – наиболее трудноискоренимых.
- Послевсходовый гербицид с последующей почвенной активностью, обеспечивающий во влажные годы контроль второй волны сорняков.
- Комбинация действующих веществ различных химических классов (трикетоны и СФМ) – надёжный инструмент антирезистентных программ.
- Упрощает процесс приготовления рабочего раствора за счёт отсутствия операций по смешиванию компонентов баковой смеси, исключает связанные с этим ошибки, в том числе – ошибки в дозировках.
- Снимает проблему несовместимости продуктов в баковых смесях (распространённая проблема при защите злаковых культур).
- Повышенная эффективность и снижение рисков для последующих культур в севообороте в сравнении с препаратами подобного класса
- Более высокая селективность и, как следствие – более широкое технологическое окно применения.

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

МАХАОН ПРО эффективен против однолетних и многолетних злаковых и двудольных сорных растений.

Однодольные виды: просо куриное (*Echinochloa crus-galli* (L.) Beauv.), виды щетинника (*Setaria* spp.), виды проса (*Panicum* spp.), мятлик однолетний (*Poa annua* L.), виды плевела (*Lolium* spp.), виды гумая (*Sorghum* spp.), пырей ползучий (*Agropyron repens*).

Двудольные виды: виды амброзии (*Ambrosia* spp.), щирица запрокинутая (*Amaranthus retroflexus* L.), канатник Теофраста (*Abutilon theophrasti* Medik.), ромашка безлепестная (*Matricaria matricarioides* L.), гречишка вьюнковая (*Fallopia convolvulus* (L.) A.), паслен черный (*Solanum nigrum* L.), звездчатка средняя (*Stellaria media* L.) виды осота (*Sonchus* spp.), виды бодяка (*Cirsium* spp.), молокан татарский (*Lactuca tatarica* (L.) A. Mey) и другие.



ОГРАНИЧЕНИЯ В СЕВОБОРОТЕ

В случае пересева в год применения препарата можно высевать только кукурузу. Не рекомендуется высевать на следующий год: сахарную свеклу, столовую и кормовую свеклу, бобовые культуры, томаты и гречиху.

Подсолнечник, сою и рапс в севообороте рекомендуется высевать только после осенней глубокой вспашки.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Норма расхода	Вредный объект	Способ, время обработки
Кукуруза	0,3-0,35 кг/га + ПАВ	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание в фазе 3-6 листьев кукурузы и ранние фазы роста сорняков (2-6 листьев у однолетних и при высоте 10-20 см у многолетних сорняков). При необходимости пересева в год применения можно высевать только кукурузу.



МАХАОН



Действующее вещество:
никосульфурон 230 г/кг
мезотрион 570 г/кг



Препаративная форма:
водно-диспергируемые
гранулы (ВДГ)



Упаковка:
5 кг

Послевсходовый гербицид против однолетних и многолетних злаковых и двудольных сорных растений в посевах кукурузы.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА

- Эффективная комбинация 2-х действующих веществ и оптимальный количественный баланс в препарате обеспечивает контроль самого широкого спектра основных однолетних и многолетних злаковых и двудольных сорняков, в том числе – наиболее трудноискоренимых (пырей, вьюнок, марь и т.д.).
- Контроль второй «волны» сорняков за счет почвенного эффекта никосульфурона.
- Высокая селективность обеспечивает широкое окно применения на кукурузе (2-6 листьев).
- Удобен в применении, логистике и хранении благодаря более концентрированной форме.

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

МАХАОН эффективен против однолетних и многолетних злаковых и двудольных сорных растений.

Однодольные виды: овсюг обыкновенный (*Avena fatua*), просо куриное (*Echinochloa crus-galli* (L.) Beauv.), виды щетинника (*Setaria* spp.), виды проса (*Panicum* spp.), мятлик однолетний (*Poa annua* L.), виды плевела (*Lolium* spp.), виды гумая (*Sorghum* spp.), пырей ползучий (*Agropyron repens*).

Двудольные виды: виды амброзии (*Ambrosia* spp.), щирица запрокинутая (*Amaranthus retroflexus* L.), канатник Теофраста (*Abutilon theophrasti* Medik.), ромашка безлепестная (*Matricaria matricarioides* L.), гречишка вьюнковая (*Fallopia convolvulus* (L.) A.), паслен черный (*Solanum nigrum* L.), звездчатка средняя (*Stellaria media* L.), виды осота (*Sonchus* spp.), виды бодяка (*Cirsium* spp.), молокан татарский (*Lactuca tatarica* (L.) A. Mey) и другие.

ОГРАНИЧЕНИЯ В СЕВООБОРОТЕ

В случае пересева в год применения препарата можно высевать только кукурузу. Не рекомендуется высевать на следующий год: сахарную свеклу, столовую и кормовую свеклу, бобовые культуры, томаты и гречиху.

Подсолнечник, сою и рапс в севообороте рекомендуется высевать только после осенней глубокой вспашки.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Норма расхода	Вредный объект	Способ, время обработки
Кукуруза	0,15 - 0,25 кг/га + ПАВ	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание в фазе 3-6 листьев кукурузы и ранние фазы роста сорняков (2-6 листьев у однолетних, при высоте 10-20 см у многолетних сорняков). При необходимости пересева в год применения можно высевать только кукурузу.



МОСКИТ ПРЕМИУМ



Действующее вещество:
трибенурон-метил 563 г/кг
флорасулам 187 г/кг



Препаративная форма:
водно-диспергируемые
гранулы (ВДГ)



Упаковка:
500 грамм

Высокоэффективный двухкомпонентный гербицид широкого спектра действия для борьбы с однолетними и многолетними двудольными сорняками в посевах яровой пшеницы и ярового ячменя.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА

- Комбинация 2-х молекул разных химических классов - лучшее решение для антирезистентной защиты культуры.
- Широкий спектр контролируемых сорняков в том числе осотов, бодяков, молочая лозного, подмаренника цепкого и др. в посевах зерновых культур.
- Широкий диапазон сроков применения.
- Высокоселективен для зерновых колосовых культур от фазы 2-3 листьев до появления флагового листа.
- Не требователен к температурному режиму. Работает начиная с 5°C.
- Не имеет ограничений по севообороту.
- Прекрасный партнер для баковых смесей.

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

МОСКИТ ПРЕМИУМ эффективен против однолетних и многолетних двудольных сорняков: бодяк полевой (*Cirsium arvense*), осот огородный (*Sonchus oleraceus*), осот шероховатый (*Sonchus asper*), лебеда раскидистая (*Atriplex patula*), вьюнок полевой* (*Convolvulus arvensis*), молочай лозный* (*Euhorbia waldsteinii*), горцы виды (*Polygonum spp.*), горчица полевая (*Sinapis arvensis*), курай-солянка русская (*Salsola australis*), подмаренник цепкий (*Galium aparine*), латук-молокан татарский (*Lactuca tatarica*), марь белая (*Chenopodium album*), пастушья сумка (*Capsella-bursa pastoris*), ромашка виды (*Matricaria spp.*), щирица запрокинутая (*Amaranthus retroflexus*), ярутка полевая (*Thlaspi arvense*), осот полевой, желтый (*Sonchus arvensis*), гречишка татарская (*Fagopyrum tataricum*), лебеда виды (*Atriplex spp.*), одуванчик лекарственный (*Taraxacum officinale*), яснотка, виды (*Lamium spp.*), сурепка обыкновенная (*Barbarea vulgaris*), чина (*Lathyrus spp.*), падалица подсолнечника (*Helianthus annuus*), падалица рапса (*Brassica napus*), паслен черный (*Solanum nigrum*), щавель курчавый (*Rumex crispus*), яснотка, виды (*Lamium spp.*) и др.

При наличии в посевах отмеченных сорных растений (*) необходимо использовать гербицид в максимальной норме расхода и на ранних этапах развития сорняка.

ОГРАНИЧЕНИЯ В СЕВООБОРОТЕ

Благодаря быстрому разложению в почве не существует, при обычной ротации в севообороте, ограничений для МОСКИТ ПРЕМИУМ в отношении последующих озимых и яровых культур включая чувствительные масличные и бобовые культуры. В случае гибели посевов по каким либо причинам, можно пересевать только яровые зерновые.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Норма расхода	Вредный объект	Способ, время обработки
Пшеница яровая, ячмень яровой	15-20 г/га + ПАВ	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу 2-3 листьев культуры до фазы выхода в трубку



МОСКИТ ФОРТЕ



Действующее вещество:
трибенурон-метил 670 г/кг
тифенсульфурон-метил 80 г/кг



Препаративная форма:
водно-диспергируемые
гранулы (ВДГ)



Упаковка:
500 грамм

Высокоселективный системный гербицид для послевсходовой борьбы с однолетними и многолетними двудольными сорняками в посевах яровой пшеницы и ячменя.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА

- Эффективная защита от комплекса однолетних и многолетних двудольных сорняков.
- Пластичность в севообороте благодаря короткому периоду полураспада до 35 дней.
- Высокая селективность к культуре и широкий диапазон сроков применения.
- Прекрасный партнер для баковых смесей.
- Сочетание двух молекул позволяет расширить спектр действия и эффективно подавлять наиболее злостные сорняки.

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

МОСКИТ ФОРТЕ эффективен против однолетних и многолетних двудольных сорняков: бодяк полевой (*Cirsium arvense*), осот огородный (*Sonchus oleraceus*), осот шероховатый (*Sonchus asper*), лебеда раскидистая (*Atriplex patula*), вьюнок полевой* (*Convolvulus arvensis*), молочай лозный* (*Euhorbia waldsteinii*), горцы виды (*Polygonum* spp.), горчица полевая (*Sinapis arvensis*), курай-солянка русская (*Salsola australis*), подмаренник цепкий (*Galium aparine*), латук-молокан татарский (*Lactuca tatarica*), марь белая (*Chenopodium album*), пастушья сумка (*Capsella-bursa pastoris*), ромашка виды (*Matricaria* spp.), щирица запрокинутая (*Amaranthus retroflexus*), ярутка полевая (*Thlaspi arvense*), осот полевой, желтый (*Sonchus arvensis*), гречишка татарская (*Fagopyrum tataricum*), лебеда виды (*Atriplex* spp.), одуванчик лекарственный (*Taraxacum officinale*), яснотка, виды (*Lamium* spp.), сурепка обыкновенная (*Barbarea vulgaris*), чина (*Lathyrus* spp.), падалица подсолнечника (*Helianthus annuus*), падалица рапса (*Brassica napus*), паслен черный (*Solanum nigrum*), щавель курчавый (*Rumex crispus*), яснотка, виды (*Lamium* spp.) и др.

При наличии в посевах отмеченных сорных растений (*) необходимо использовать гербицид в максимальной норме расхода и на ранних этапах развития сорняка.

ОГРАНИЧЕНИЯ В СЕВООБОРОТЕ

Благодаря быстрому разложению в почве не существует, при обычной ротации в севообороте ограничений для МОСКИТ ФОРТЕ в отношении последующих озимых и яровых культур. В случае гибели посевов по каким либо причинам, можно пересевать яровые зерновые сразу после обработки посевов МОСКИТ ФОРТЕ. Масличные культуры как рапс, лен, подсолнечник, сафлор можно пересевать по истечении 60 дней после обработки МОСКИТ ФОРТЕ.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Норма расхода	Вредный объект	Способ, время обработки
Пшеница яровая, ячмень яровой	10-20 г/га + ПАВ	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам независимо от фазы развития культуры



ПРОГРЕСС



Действующее вещество:

2-этилгексилловый эфир
2,4-Д кислоты 905 г/л



Препаративная форма:
концентрат эмульсии (КЭ)



Упаковка:
20 литров

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Однолетние и многолетние двудольные сорняки.

ОГРАНИЧЕНИЯ В СЕВОБОРОТЕ

Отсутствуют. В случае необходимости ликвидации посевов, обработанных ранее гербицидом ПРОГРЕСС (например, высокая гибель культурных растений вследствие заморозков, засухи, поражения болезнями и др.), на том же поле после вспашки можно высевать любые культуры.

Послевсходовый гербицид системного действия для применения на посевах зерновых колосовых культур в борьбе с однолетними и многолетними двудольными (широколиственными) сорняками.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА

- Гербицид системного действия: в течение часа проникает и распространяется по растению, блокируя ростовые процессы. Эффективно поражает как многие однолетние, так и многолетние сорняки, включая корнеотпрысковые.
- Обеспечивает максимальный эффект по сравнению с аминными солями при более низких (в 1,7-2,0 раза) нормах расхода 2,4-Д кислоты на 1 га.
- Действие эфира на сорняки (визуальный эффект) проявляется через 12-18 часов, что в 2-4 раза быстрее, чем при использовании аминных солей и в 10 раз – сульфонилмочевин.
- Начало проявления гербицидной активности происходит при температуре +5°C, у других препаратов этой группы – при +8-12°C.
- Совместим с другими гербицидами против двудольных, а также с граминицидами, инсектицидами, фунгицидами, регуляторами роста и удобрениями.
- Дождестоек: не смывается дождем через час после обработки. Эффективность его в условиях засухи не снижается

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Норма расхода	Вредный объект	Способ, время обработки
Пшеница яровая, ячмень яровой	0,4-0,6 л/га	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку



ПРОГРЕСС 720



Действующее вещество:

диметиламинная соль
2,4 – Д 720 г/л



Препаративная форма: водный раствор (ВР)



Упаковка:
20 литров

Послевсходовый гербицид системного действия для применения в посевах зерновых колосовых культур в борьбе с однолетними и многолетними двудольными сорняками.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА

- Широкий спектр активности против наиболее вредоносных видов двудольных сорняков, включая вьюнок полевой, полынь горькую, виды осота.
- Обладает ярко выраженным системным действием - первые признаки видны в течение 2-4 часов после применения.
- Хороший партнёр для баковых смесей.
- Характеризуется высокой селективностью к культурам и отсутствием видовой чувствительности.
- Наиболее пригоден для обработки посевов в непосредственной близости от природоохраненных зон - лесных массивов, лесополос.

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

ПРОГРЕСС эффективен против двудольных сорняков: бодяк полевой (*Cirsium arvense*), осот огородный (*Sonchus oleraceus*), осот шероховатый (*Sonchus asper*), лебеда раскидистая (*Atriplex patula*), вьюнок полевой* (*Convolvulus arvensis*), молочай лозный (*Euhorbia waldsteinii*), полынь горькая* (*Artemisia absinthium*), полынь обыкновенная* (*Artemisia vulgare*), горцы виды (*Polygonum* spp.), горчица полевая (*Sinapis arvensis*), курай-солянка русская (*Salsola australis*), латук-молокан татарский (*Lactuca tatarica*), марь белая (*Chenopodium album*), пастушья сумка (*Capsella-bursa pastoris*), ромашка виды (*Matricaria* spp.), щирица запрокинутая (*Amaranthus retroflexus*), ярутка полевая (*Thlaspi arvense*), осот полевой, желтый (*Sonchus arvensis*), гречишка татарская (*Fagopyrum tataricum*), лебеда виды (*Atriplex* spp.), одуванчик лекарственный (*Taraxacum officinale*), сурепка обыкновенная (*Barbarea vulgaris*), чина (*Lathyrus* spp.), падалица подсолнечника (*Helianthus annuus*), падалица рапса (*Brassica napus*), паслен черный (*Solanum nigrum*), щавель курчавый (*Rumex crispus*) и др.

При наличии в посевах отмеченных сорных растений (*) необходимо использовать гербицид в максимальной норме расхода и на ранних этапах развития сорняка.

ОГРАНИЧЕНИЯ В СЕВООБОРОТЕ

При обычной ротации севооборота благодаря быстрому разложению ограничения отсутствуют. В случае пересева полей ранее обработанных ПРОГРЕСС 720, после глубокой механической обработки допускается высев любых культур, в том числе озимых.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Норма расхода	Вредный объект	Способ, время обработки
Пшеница яровая, ячмень яровой	0,7 - 1,0 л/га	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры до выхода в трубку.
Поля, предназначенные под посев зерновых культур	0,35 - 0,5 л/га		Опрыскивание вегетирующих сорняков весной или осенью. Применяется в качестве добавки к глифосатам.
Пары			Опрыскивание вегетирующих сорняков.



ПРОГРЕСС ГРАНД



Действующее вещество:

2,4-Д кислота в виде сложного эфира 440 г/л
флуроксипир 40 г/л
карфентразон-этил 20 г/л



Препаративная форма:
концентрат эмульсии (КЭ)



Упаковка:
20 литров

Универсальный трехкомпонентный гербицид системного действия для применения по всходам зерновых культур для борьбы против однолетних и многолетних двудольных (широколистных) сорных растений.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА

- Комбинация трех молекул из разных химических классов.
- Быстрый видимый гербицидный эффект препарата, благодаря контактному действию карфентразон-этила.
- Широкий спектр контролируемых двудольных сорняков.
- Быстрое проникновение и ярко выраженное системное действие.
- Эффективный контроль вьюнка полевого, подмаренника цепкого и молочая лозного.
- Нет ограничений для последующих культур в севообороте (рапс, подсолнечник, горох, нут, соя, и т.д.).

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

ПРОГРЕСС ГРАНД эффективен против двудольных сорняков: бодяк полевой (*Cirsium arvense*), осот огородный (*Sonchus oleraceus*), осот шероховатый (*Sonchus asper*), лебеда раскидистая (*Atriplex patula*), вьюнок полевой* (*Convolvulus arvensis*), молочай лозный (*Euphorbia waldsteinii*), полынь обыкновенная* (*Artemisia vulgare*), горцы виды (*Polygonum spp.*), горчица полевая (*Sinapis arvensis*), курай-солянка русская (*Salsola australis*), латук-молокан татарский (*Lactuca tatarica*), марь белая (*Chenopodium album*), пастушья сумка (*Capsella-bursa pastoris*), ромашка виды (*Matricaria spp.*), щирица запрокинутая (*Amaranthus retroflexus*), ярутка полевая (*Thlaspi arvense*), осот полевой, желтый (*Sonchus arvensis*), гречишка татарская (*Fagopyrum tataricum*), лебеда виды (*Atriplex spp.*), одуванчик лекарственный (*Taraxacum officinale*), сурепка обыкновенная (*Barbarea vulgaris*), чина (*Lathyrus spp.*), падалица подсолнечника (*Helianthus annus*), падалица рапса (*Brassica napus*), паслен черный (*Solanum nigrum*), щавель курчавый (*Rumex crispus*) и др.

При наличии в посевах отмеченных сорных растений (*) необходимо использовать гербицид в максимальной норме расхода и на ранних этапах развития сорняка.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Норма расхода	Вредный объект	Способ, время обработки
Пшеница яровая	0,35-0,45 л/га	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры
Ячмень яровой	0,35-0,45 л/га		
Пшеница яровая, ячмень яровой	0,25-0,35 л/га		Применяется в качестве добавки к сульфонилмочевинам при опрыскивании посевов в фазе кущения культуры



ПРОГРЕСС УЛЬТРА



Действующее вещество:

флуороксипир 90 г/л
2,4-Д кислота

в виде сложного эфира 510 г/л



Препаративная форма:
концентрат эмульсии (КЭ)



Упаковка:
20 литров

Универсальный двухкомпонентный гербицид системного действия для применения по всходам зерновых культур для борьбы против однолетних и многолетних двудольных (широколистных) сорных растений.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА

- Комбинация двух молекул из разного химического класса.
- Широкий спектр контролируемых двудольных сорняков.
- Быстрое проникновение и ярко выраженное системное действие.
- Эффективный контроль вьюнка полевого и молочая лозного.
- Нет ограничений для последующих культур в севообороте (рапс, подсолнечник, горох, нут, соя, и т.д.).

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

ПРОГРЕСС УЛЬТРА эффективен против двудольных сорняков: бодяк полевой (*Cirsium arvense*), осот огородный (*Sonchus oleraceus*), осот шероховатый (*Sonchus asper*), лебеда раскидистая (*Atriplex patula*), вьюнок полевой* (*Convolvulus arvensis*), молочай лозный (*Euhorbia waldsteinii*), полынь горькая* (*Artemisia absinthium*), полынь обыкновенная* (*Artemisia vulgare*), горцы виды (*Polygonum spp.*), горчица полевая (*Sinapis arvensis*), курай-солянка русская (*Salsola australis*), латук-молокан татарский (*Lactuca tatarica*), марь белая (*Chenopodium album*), пастушья сумка (*Capsella-bursa pastoris*), ромашка виды (*Matricaria spp.*), щирица запрокинутая (*Amaranthus retroflexus*), ярутка полевая (*Thlaspi arvense*), осот полевой, желтый (*Sonchus arvensis*), гречишка татарская (*Fagopyrum tataricum*), лебеда виды (*Atriplex spp.*), одуванчик лекарственный (*Taraxacum officinale*), сурепка обыкновенная (*Barbarea vulgaris*), чина (*Lathyrus spp.*), падалица подсолнечника (*Helianthus annus*), падалица рапса (*Brassica napus*), паслен черный (*Solanum nigrum*), щавель курчавый (*Rumex crispus*) и др.

При наличии в посевах отмеченных сорных растений (*) необходимо использовать гербицид в максимальной норме расхода и на ранних этапах развития сорняка.

ОГРАНИЧЕНИЯ В СЕВООБОРОТЕ

Благодаря быстрому разложению в почве не существует, при обычной ротации в севообороте, ограничений для ПРОГРЕСС УЛЬТРА в отношении последующих озимых и яровых культур включая чувствительные масличные и бобовые культуры.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Норма расхода	Вредный объект	Способ, время обработки
Пшеница и ячмень яровой	0,3-0,5 л/га	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры

СЕЛЕНИТ



СЕЛЕНИТ


Действующее вещество:
амидосульфурон 600 г/кг
метсульфурон-метил 150 г/кг


Препаративная форма:
водно-диспергируемые
гранулы (ВДГ)


Упаковка:
5 кг



Баковая смесь: Селенит
0,020 кг/га + Солекс 0,3 л/га

Послевсходовый системный гербицид для защиты посевов зерновых культур и льна против двудольных сорных растений.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА

- Оптимальная комбинация двух наиболее эффективных сульфонилмочевин – мощный инструмент борьбы с сорной растительностью, эффективный инструмент антирезистентных программ.
- Обеспечивает гарантированное уничтожение широкого спектра малолетних двудольных, видов осота, а также надёжный (непревзойдённый) контроль наиболее трудноискоренимых корнеотпрысковых двудольных, вьюнка.
- Готовый двухкомпонентный препарат, исключающий необходимость приготовления баковой смеси, исключает так же ошибки при её приготовлении, в том числе – ошибки в дозировках.
- Невысокая, удобная для работы норма расхода – благоприятная технологическая и логистическая характеристика.
- Универсальный препарат для борьбы с широким спектром сорняков в посевах яровых зерновых, льна.
- Прекрасный партнёр для составления баковых смесей с другими гербицидами, инсектицидами и фунгицидами.
- Высокая селективность к обрабатываемой культуре.
- Широкое технологическое окно применения.
- Оригинальность состава – дополнительные экономические преимущества.

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

СЕЛЕНИТ эффективен против однолетних и многолетних двудольных сорняков в посевах зерновых культур и льна.

ОГРАНИЧЕНИЯ В СЕВООБОРОТЕ

В отношении последующих в севообороте зерновых культур ограничений для применения СЕЛЕНИТ не существует. На следующий год после применения препарата нельзя высевать чувствительные к сульфонилмочевинам культуры – свеклу и овощные. Гречиху, рапс, подсолнечник, зернобобовые культуры рекомендуется высевать после проведения глубокой осенней вспашки. При необходимости пересева обработанных СЕЛЕНИТ площадей, рекомендуется высевать только яровые зерновые, лен, кукурузу.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Норма расхода	Вредный объект	Способ, время обработки
Лён	10-20 г/га	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу «ёлочка»
Пшеница яровая, ячмень яровой			Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев – до выхода в трубку



СЕЛЕНИТ ПРО



Действующее вещество:
клопиралид 500 г/кг
амидосульфурон 200 г/кг
метсульфурон-метил 50 г/кг



Препаративная форма:
водно-диспергируемые
гранулы (ВДГ)



Упаковка:
5 кг

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

СЕЛЕНИТ ПРО эффективен против однолетних и многолетних двудольных сорняков в посевах зерновых культур и льна.

ОГРАНИЧЕНИЯ В СЕВОБОРОТЕ

В отношении последующих в севообороте зерновых культур ограничений для применения СЕЛЕНИТ ПРО не существует. На следующий год после применения нельзя высевать чувствительные к сульфонилмочевинам культуры – свеклу и овощные. Гречиху, рапс, подсолнечник, зернобобовые культуры рекомендуется высевать после проведения глубокой осенней вспашки. При необходимости пересева обработанных площадей, рекомендуется высевать только яровые зерновые культуры.

Комбинированный послевсходовый системный гербицид для защиты посевов зерновых культур и льна против широкого спектра двудольных сорных растений.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА

- Уникальная комбинация 3-х высокоэффективных действующих веществ и оптимальный количественный баланс в препарате обеспечивает гарантированное уничтожение и максимальный контроль самого широкого спектра однолетних и многолетних сорняков, в том числе – наиболее трудноискоренимых.
- Отличный инструмент антирезистентных программ.
- Упрощает процесс приготовления рабочего раствора за счёт отсутствия операций по смешиванию компонентов баковой смеси, исключает связанные с этим ошибки, в том числе – ошибки в дозировках.
- Благодаря наличию в составе амидосульфурона обладает наиболее широким спектром действия, а содержание клопираллада обеспечивает максимальную эффективность по всем разновидностям осотов.
- Невысокая, удобная для работы норма расхода – положительная технологическая и логистическая характеристика.
- Универсален в использовании: применяется в посевах яровых зерновых и льна.
- Высокоселективен по отношению к обрабатываемой культуре.
- Широкое технологическое окно применения.
- Прекрасный партнёр для баковых смесей с другими гербицидами, инсектицидами,



МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

Амидосульфурон и метсульфурон-метил - гербициды системного действия, относятся к классу сульфонилмочевин. Быстро поглощаются листьями и частично корневой системой сорняков, свободно перемещаются по всему растению с нисходящим и восходящим токами питательных веществ. Благодаря системному действию проникают во все части растения и накапливаются в точках роста, включая «спящие» почки. На биохимическом уровне воздействуют на фермент ацетолактатсинтазу (AHAS), участвующий в цепи биосинтеза аминокислот, и нарушающий процессы синтеза белков, что вызывает прекращение деления клеток в меристемных тканях сорных растений.

Клопиралид – нарушает процессы роста, происходящие в растении. Являясь синтетической формой натурального растительного гормона, клопиралид, при его применении в качестве гербицида, замещает натуральные гормоны растения, блокируя, таким образом, их функции. При этом также происходит перенасыщение синтетическими гормонами, что в конечном результате приводит к значительным нарушениям ростовых процессов в растении и последующей его гибели.



Селенит ПРО 0,050 кг/га- против падалицы подсолнечника

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Норма расхода	Вредный объект	Способ, время обработки
Лён	50 г/га	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу «ёлочки» культуры
Пшеница яровая, ячмень яровой			Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев – до второго междоузлия культуры



СЕЛЕНИТ ФОРТЕ



Действующее вещество:
клопиралид 710 г/кг
метсульфурон-метил 40 г/кг



Препаративная форма:
водно-диспергируемые
гранулы (ВДГ)



Упаковка:
500 грамм



Комбинированный двухкомпонентный гербицид для защиты масличных и зерновых культур против широкого спектра однолетних и многолетних двудольных сорных растений.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА

- Высокая эффективность против злостных корнеотпрысковых сорняков.
- Контроль нескольких «волн» падалицы подсолнечника, в том числе гибридов, устойчивых к имидазолинонам.
- Широкий спектр действия и высокая эффективность благодаря присутствию двух действующих веществ.

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Эффективен против однолетних и многолетних двудольных сорняков в посевах зерновых культур и льна.

ОГРАНИЧЕНИЯ В СЕВООБОРОТЕ

В отношении последующих в севообороте зерновых культур ограничений для применения СЕЛЕНИТ ФОРТЕ не существует. На следующий год после применения нельзя высевать чувствительные к сульфонилмочевинам культуры – свеклу и овощные. Гречиху, рапс, подсолнечник, зернобобовые культуры рекомендуется высевать после проведения глубокой осенней вспашки. При необходимости пересева обработанных СЕЛЕНИТ ФОРТЕ площадей, рекомендуется высевать только яровые зерновые культуры.

Спектр активности: эффективен против однолетних и многолетних двудольных сорняков в посевах зерновых культур и льна.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Норма расхода	Вредный объект	Способ, время обработки
Пшеница яровая, ячмень яровой	50 - 80 г/га	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры до выхода в трубку
Лен масличный	50 - 80 г/га	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу «ёлочки» культуры



СКАУТ ПРО



Действующее вещество:
феноксапроп-п-этил 162 г/л
клодинафоп-пропаргил 80 г/л
клоквинтоцет-мексил 50 г/л



Препаративная форма:
концентрат эмульсии (КЭ)



Упаковка:
5 литров

Высокоселективный комбинированный гербицид для послевсходовой обработки пшеницы против широкого спектра однолетних злаковых сорняков.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА

- Благодаря содержанию двух действующих веществ достигается универсальность в применении и эффективное решение с любым типом злаковых сорняков: высокая эффективность против просовидных и овсяга обыкновенного.
- Применение не зависимо от фазы развития культуры.
- Отсутствие ограничений в севообороте за счет короткого периода распада в почве.
- Полная селективность к культурам, благодаря присутствию в составе антидота.

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Эффективен против однолетних злаковых сорняков: овсяг обыкновенный (*Avena fatua*), просо (*Panicum* spp.), щетинник виды (*Setaria* spp.); куриное просо (*Echinochloa crus-galli*), лисохвост мышехвостниковидный (*Alopecurus myosuroides*), падалица кукурузы (*Zea mays*).

ОГРАНИЧЕНИЯ В СЕВОБОРОТЕ

Не обладает почвенным эффектом. Попадая в почву, происходит быстрое разложение гербицида на биологически неактивные компоненты. Таким образом, ограничений по севообороту для последующих культур не существует.



РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Норма расхода	Вредный объект	Способ, время обработки
Пшеница яровая	0,3 – 0,4 л/га	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам независимо от фазы развития культуры



СКАУТ УЛЬТРА



Действующее вещество:
феноксапроп-п-этил 170 г/л
клодинафоп-пропаргил 48,5 г/л
клоквинтоцет-мексил 57 г/л
(антидот)



Препаративная форма:
концентрат эмульсии (КЭ)



Упаковка:
5 литров

Высокоселективный комбинированный гербицид для послевсходовой обработки пшеницы против широкого спектра однолетних злаковых сорняков.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА

- Усиленное действие на просовидные сорные растения и щетинники.
- Высокий контроль овсяга обыкновенного в посевах пшеницы.
- Широкий диапазон сроков применения, благодаря антидоту клоквинтоцет-мексил.
- Нет ограничений по культурам в севообороте, быстрый распад в почве.
- Высокая экономическая эффективность в контроле овсяга, просянок, щетинников и других злаковых сорняков.
- Концентрированная форма препарата – удобство в применении и хранении.

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

СКАУТ УЛЬТРА эффективен против однолетних злаковых сорняков: просо виды (*Panicum spp.*), щетинник виды (*Setaria spp.*), овсяг обыкновенный (*Avena fatua*), куриное просо (*Echinochloa crus-galli*), лисохвост мышехвостниковидный (*Alopecurus myosuroides*), падалица кукурузы (*Zea mays*).

ОГРАНИЧЕНИЯ В СЕВОБОРОТЕ

Не обладает почвенным эффектом. Попадая в почву, происходит быстрое разложение гербицида на биологически неактивные компоненты. Таким образом, ограничений по севообороту для последующих культур не существует.



СКАУТ ультра: эффективность против злаковых сорняков в посевах яровой пшеницы

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Норма расхода	Вредный объект	Способ, время обработки
Пшеница яровая	0,3-0,45 л/га	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам не зависимо от фазы развития культуры



СКАУТ ФОРТЕ



Действующее вещество:
феноксапроп-п-этил 140 г/л
клодинафоп-пропаргил 90 г/л
клоквинтоцет-мексил 72 г/л
(антидот)



Препаративная форма:
концентрат эмульсии (КЭ)



Упаковка:
5 литров

Высокоэффективный послевсходовый гербицид, эффективен против однолетних злаковых сорняков в посевах пшеницы.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА

- Уникальное сочетание самых эффективных действующих веществ.
- Высокий контроль широкого спектра злаковых сорняков.
- Эталонная селективность к культуре благодаря высокой концентрации антидота.
- Может быть использован при самых различных погодных условиях без потери эффективности.
- Широкий диапазон сроков применения.
- Быстрое действие (рост сорняков прекращается через 20 часов после применения).

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

СКАУТ ФОРТЕ эффективен против однолетних злаковых сорняков: овсюг обыкновенный (*Avena fatua*), просо (*Panicum spp.*), щетинник виды (*Setaria spp.*); куриное просо (*Echinochloa crus-galli*), лисохвост мышехвостниковидный (*Alopecurus myosuroides*), падалица кукурузы (*Zea mays*).

ОГРАНИЧЕНИЯ В СЕВОБОРОТЕ

Не обладает почвенным эффектом. Попадая в почву, происходит быстрое разложение гербицида на биологически неактивные компоненты. Таким образом, ограничений по севообороту для последующих культур не существует.



РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Норма расхода	Вредный объект	Способ, время обработки
Пшеница яровая	0,3-0,4 л/га	Однолетние злаковые (овсюг обыкновенный, виды просянки, виды щетинника)	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам (независимо от фазы развития культуры).



СМАРАГД



Действующее вещество:
феноксапроп-п-этил 69 г/л
клоквинтоцет-мексил 35 г/л
(антидот)



Препаративная форма:
концентрат эмульсии (КЭ)



Упаковка:
5 литров

Высокоселективный гербицид для послевсходовой обработки ячменя и пшеницы против широкого спектра однолетних злаковых сорняков.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА

- Высокая эффективность на однолетние злаковые сорняки в посевах зерновых культур.
- Благодаря большому содержанию антидота отмечается высокий уровень селективности к культуре.
- Широкое технологическое окно в сроках применения.
- Нет ограничений по севообороту.
- Высокая экономическая эффективность контроля овсяга, просянок, щетинников и других злаковых сорняков.

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Эффективен против широкого спектра злаковых сорняков: овсяг, виды (*Avena* spp.); просо, (*Panicum* spp.); куриное просо (*Echinochloa crus-galli*); лисохвост мышехвостиковидный (*Alopecurus myosuroides*); метлица обыкновенная (*Apera spica-venti*); кукуруза, падалица (*Zea mais*); щетинник, виды (*Setaria* spp.).

ОГРАНИЧЕНИЯ В СЕВООБОРОТЕ

Не обладает почвенным эффектом. Попадая в почву, происходит быстрое разложение гербицида на биологически неактивные компоненты. Таким образом, ограничений по севообороту для последующих культур не существует.



РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Норма расхода	Вредный объект	Способ, время обработки
Пшеница яровая	0,8-1,2 л/га	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам (независимо от фазы развития культуры)
Ячмень яровой	0,6-0,9 л/га		



СМАРАГД ФОРТЕ



Действующее вещество:
феноксапроп-п-этил 140 г/л
клоквинтоцет-мексил 70 г/л
(антидот)



Препаративная форма:
концентрат эмульсии (КЭ)



Упаковка:
5 литров

Высокоселективный гербицид для послевсходовой обработки пшеницы и ячменя против широкого спектра однолетних злаковых сорняков.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА

- Эффективно контролирует однолетние злаковые сорняки в посевах зерновых культур.
- Благодаря высокому содержанию антидота более высокий уровень селективности к культуре.
- Широкое технологическое окно в сроках применения.
- Нет ограничений по севообороту.
- Высокая экономическая эффективность контроля овсяга, просо (виды), щетинников и других злаковых сорняков.
- Удобен в применении и хранении благодаря более концентрированной форме.

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

СМАРАГД ФОРТЕ эффективен против однолетних злаковых сорняков: просо (*Panicum spp.*), щетинник виды (*Setaria spp.*), овсяг обыкновенный (*Avena fatua*), куриное просо (*Echinochloa crusgalli*), лисохвост мышехвостниковидный (*Alopecurus myosuroides*), падалица кукурузы (*Zea mays*).



ОГРАНИЧЕНИЯ В СЕВООБОРОТЕ

Не обладает почвенным эффектом. Попадая в почву, происходит быстрое разложение гербицида на биологически неактивные компоненты. Таким образом, ограничений по севообороту для последующих культур не существует.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Норма расхода	Вредный объект	Способ, время обработки
Пшеница яровая	0,5-0,6 л/га	Однолетние злаковые сорняки (овсяг, щетинники, просо куриное, просо сорнополевое)	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам (независимо от фазы развития культуры)
Ячмень яровой	0,5 л/га		



СОЛЕКС



Действующее вещество:
МЦПА соль 750 г/л



Препаративная форма:
водный раствор (ВР)



Упаковка:
20 литров

Селективный гербицид для борьбы с двудольными сорняками в посевах льна и зерновых культур.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА

- Хороший и надежный партнер для применения в баковых смесях с другими гербицидами.
- Высокая гербицидная активность против широкого спектра двудольных сорняков (в том числе вьюнок полевой, молочай лозный и т.д.).
- Нет ограничений по последствию на последующие культуры в севообороте.
- Быстрое проявление симптомов действия препарата (на 2-3 сутки после применения) с последующей длительной защитой.
- Мягкий препарат при использовании на зерновых культурах.

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

СОЛЕКС эффективен против двудольных сорняков: вьюнок полевой (*Convolvulus arvensis*), бодяк полевой* (*Cirsium arvensis*), осот огородный (*Sonchus oleraceus*), лебеда раскидистая (*Atriplex patula*), молочай лозный (*Euhorbia waldesteinii*), полынь обыкновенная* (*Artemisia vulgare*), горчица полевая (*Sinapis arvensis*), латук-молокан татарский* (*Lactuca tatarica*), марь белая (*Chenopodium album*), пастушья сумка (*Capsella bursa pastoris*), щирица запрокинутая (*Amaranthus retroflexus*), ярутка полевая (*Thlaspi arvensis*), осот полевой, желтый (*Sonchus arvensis*), гречишка татарская (*Fagopyrum tataricum*), лебеда виды (*Atriplex spp.*), одуванчик лекарственный (*Taraxacum officinale*), сурепка обыкновенная (*Barbarea vulgaris*), падалица подсолнечника (*Helianthus annuus*), падалица рапса (*Brassica napus*), паслен черный (*Solanum nigrum*) и др.

При наличии в посевах отмеченных сорных растений (*) необходимо использовать гербицид в максимальной норме расхода и на ранних этапах развития сорняка.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Норма расхода	Вредный объект	Способ, время обработки
Лен масличный	0,4 л/га	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе «ёлочки» культуры и ранние фазы роста сорняков
Пшеница и ячмень яровые	0,7-1,0 л/га		Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры



СОЛЕКС ПРО



Действующее вещество:
МЦПА 570 г/л



Препаративная форма:
концентрат эмульсии (КЭ)



Упаковка:
20 литров

Селективный гербицид для борьбы с двудольными сорняками в посевах льна масличного и зерновых культур в новой препаративной форме

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА

- Улучшенная эффективность на сорняки за счет новой формуляции.
- Хороший и надежный партнер для применения в баковых смесях с другими гербицидами, в том числе и противозлаковыми.
- Высокая гербицидная активность против широкого спектра двудольных сорняков (в том числе вьюнок полевой, молочай лозный и т.д.).
- Нет ограничений по последствию на последующие культуры в севообороте.
- Быстрое проявление симптомов действия препарата (на 2-3 сутки после применения) с последующей длительной защитой

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

СОЛЕКС ПРО эффективен против двудольных сорняков: вьюнок полевой (*Convolvulus arvensis*), бодяк полевой* (*Cirsium arvense*), осот огородный (*Sonchus oleraceus*), лебеда раскидистая (*Atriplex patula*), молочай лозный* (*Euphorbia waldsteinii*), полынь обыкновенная* (*Artemisia vulgare*), горчица полевая (*Sinapis arvensis*), латук-молочан татарский* (*Lactuca tatarica*), марь белая (*Chenopodium album*), пастушья сумка (*Capsella-bursa pastoris*), щирица запрокинутая (*Amaranthus retroflexus*), ярутка полевая (*Thlaspi arvense*), осот полевой, желтый (*Sonchus arvensis*), гречишка татарская (*Fagopyrum tataricum*), лебеда виды (*Atriplex* spp.), одуванчик лекарственный (*Taraxacum officinale*), сурепка обыкновенная (*Barbarea vulgaris*), падалица подсолнечника (*Helianthus annuus*), падалица рапса (*Brassica napus*), паслен черный (*Solanum nigrum*) и др.

При наличии в посевах отмеченных сорных растений (*) необходимо использовать гербицид в максимальной норме расхода и на ранних этапах развития сорняка.

ОГРАНИЧЕНИЯ В СЕВООБОРОТЕ

В случае применения гербицида СОЛЕКС ПРО в рекомендуемых нормах расхода ограничения по севообороту отсутствуют. На следующий год можно высевать любые бобовые, технические и масличные культуры.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Норма расхода	Вредный объект	Способ, время обработки
Пшеница яровая, ячмень яровой	0,4-0,6 л/га	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кущения до выхода в трубку культуры
	0,3-0,4 л/га		Применяется в качестве добавки к 2,4-Д при опрыскивании в фазе кущения культуры
			Применяется в качестве добавки к сульфонилмочевинам при опрыскивании в фазу кущения до выхода в трубку культуры



СОЛЬВЕР



Действующее вещество:
Хизалофоп-п-тефурил 120 г/л



Препаративная форма:
концентрат эмульсии (КЭ)



Упаковка:
5 литров

Селективный гербицид для борьбы с комплексом однолетних и многолетних злаковых сорняков в посевах масличных и бобовых культур.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА

- Высокая системная активность.
- Быстрое проникновение в листовую поверхность.
- Высокая степень селективности и отсутствие фитотоксичности.
- Отсутствие остаточных количеств в продукции при соблюдении своевременности регламентов обработки культуры.
- Низкий класс опасности для человека и энтомофагов.

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

СОЛЬВЕР эффективен против однолетних и многолетних злаковых сорняков.



РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Норма расхода	Вредный объект	Способ, время обработки
Лён масличный, рапс яровой, подсолнечник	0,25-0,35 л/га	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам
	0,4-0,5 л/га	Многолетние злаковые сорняки	



СПИРИТ



Действующее вещество:
клопиралид 750 г/кг



Препаративная форма:
водно-диспергируемые
гранулы (ВДГ)



Упаковка:
5 кг

Послевсходовый гербицид системного действия для борьбы с однолетними двудольными и многолетними корнеотпрысковыми сорняками на посевах сельскохозяйственных культур.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА

- Эталонная эффективность против малолетних и многолетних двудольных сорняков, включая виды осота и бодяка. Исключительно эффективен против злостных, трудноистребимых корнеотпрысковых многолетников, таких как осот розовый и его подвиды, осот желтый, осот голубой (молокан татарский).
- Обладает системным действием. Уничтожает не только надземные части, но и корневую систему сорняков, включая почки возобновления и корневые отпрыски, тем самым полностью исключает их отрастание и вегетативное размножение.
- Широкий диапазон сроков применения.

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

СПИРИТ эффективен против двудольных сорняков: бодяк полевой (*Cirsium arvense*), осот огородный (*Sonchus oleraceus*), осот шероховатый (*Sonchus asper*), осот полевой, желтый (*Sonchus arvensis*), латук-молокан татарский (*Lactuca tatarica*), молочай лозный* (*Euhorbia waldsteinii*), полынь горькая* (*Artemisia absentium*), полынь обыкновенная* (*Artemisia vulgare*), горцы виды (*Polygonum spp.*), ромашка виды (*Matricaria spp.*), гречишка татарская (*Fagopyrum tataricum*) и др.

При наличии в посевах отмеченных сорных растений (*) необходимо использовать гербицид в максимальной норме расхода и на ранних этапах развития сорняка.

ОГРАНИЧЕНИЯ В СЕВОБОРОТЕ

Клопиралид подвергается быстрому микробиологическому разложению в почве. На следующий год, после применения препарата на том же поле можно выращивать любые культуры, кроме бобовых (соя, чечевица, горох, нут – ограничение в севообороте от 16 до 22 месяцев) и подсолнечника. В случае необходимости пересева культуры в год обработки (например, гибель растений от заморозков, засухи, поражения болезнями и т.п.) на том же поле, после проведения вспашки, можно выращивать зерновые, кукурузу, рапс, горчицу, капусту, лен, сахарную свеклу.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Норма расхода	Вредный объект	Способ, время обработки
Рапс	0,12-0,16 кг/га	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-4 листьев культуры
Горчица			Опрыскивание посевов в фазе 3-4 настоящих листьев до бутонизации культуры
Лен	0,14 кг/га		Опрыскивание посевов в фазе «ёлочки» культуры



СПИРИТ ЛАЙТ



Действующее вещество:

МЦПА 367 г/л
клопиралид 124 г/л



Препаративная форма:
водный раствор (ВР)



Упаковка:
20 литров

Гербицид системного действия для борьбы с однолетними и многолетними двудольными сорняками в посевах льна масличного.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА

- Уникальная комбинация 2-х молекул различного химического класса - лучшее решение для антирезистентной программы.
- Лучшее решение для борьбы с трудноискоренимыми двудольными сорняками (вьюнок полевой, молочаем лозным) в посевах масличного льна.
- Обладает системным действием. Уничтожает не только надземные части, но и корневую систему сорняков, включая почки возобновления и корневые отпрыски, тем самым полностью исключает их отрастание и вегетативное размножение.

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

СПИРИТ ЛАЙТ эффективен против двудольных сорняков: бодяк полевой (*Cirsium arvense*), осот огородный (*Sonchus oleraceus*), осот шероховатый (*Sonchus asper*), осот полевой, желтый (*Sonchus arvensis*), латук-молокан татарский (*Lactuca tatarica*), вьюнок полевой (*Convolvulus arvensis*), лебеда раскидистая (*Atriplex patula*), молочай лозный (*Euphorbia waldsteinii*), полынь горькая* (*Artemisia absentium*), полынь обыкновенная* (*Artemisia vulgare*), горцы виды (*Polygonum spp.*), горчица полевая (*Sinapis arvensis*), марь белая (*Chenopodium album*), пастушья сумка (*Capsella-bursa pastoris*), ромашка виды (*Matricaria spp.*), щирица запрокинутая (*Amaranthus retroflexus*), ярутка полевая (*Thlaspi arvense*), гречишка татарская (*Fagopyrum tataricum*), лебеда виды (*Atriplex spp.*), одуванчик лекарственный (*Taraxacum officinale*), сурепка обыкновенная (*Barbarea vulgaris*), чина (*Lathyrus spp.*), падалица подсолнечника (*Helianthus annus*), падалица рапса (*Brassica napus*), паслен черный (*Solanum nigrum*), щавель курчавый (*Rumex crispus*) и др.

При наличии в посевах отмеченных сорных растений (*) необходимо использовать гербицид в максимальной норме расхода и на ранних этапах развития сорняка.

ОГРАНИЧЕНИЯ В СЕВООБОРОТЕ

СПИРИТ ЛАЙТ подвергается быстрому микробиологическому разложению в почве. На следующий год, после применения препарата на том же поле можно выращивать любые культуры, кроме бобовых (соя, чечевица, горох, нут – ограничение в севообороте от 18 до 22 месяцев) и подсолнечника. В случае необходимости пересева культуры в год обработки (например, гибель растений от заморозков, засухи, поражения болезнями и т.п.) на том же поле, после проведения вспашки, можно выращивать зерновые, кукурузу, рапс, горчицу, капусту, лен, сахарную свеклу.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Норма расход	Вредный объект	Способ, время обработки
Лен масличный	0,5 л/га	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе «ёлочки» культуры и ранние фазы роста сорняков



СТАНИС ПРО



Действующее вещество:
амидосульфурон 400 г/кг
тифенсульфурон-метил 200 г/кг
метсульфурон-метил 150 г/кг



Препаративная форма:
водно-диспергируемые
гранулы (ВДГ)



Упаковка:
500 грамм

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Эффективен против однолетних и многолетних двудольных сорняков.

ОГРАНИЧЕНИЯ В СЕВООБОРОТЕ

Препарат рекомендуется использовать в севообороте на льне с последующими зерновыми колосовыми культурами и, наоборот, на зерновых колосовых с последующим за ними льном. На следующий год после обработки не рекомендуется проводить посев таких культур, как рапс яровой и озимый, подсолнечник, овощные, бахчевые, бобовые.

Селективный гербицид для защиты посевов зерновых культур и льна масличного от однолетних и многолетних двудольных сорняков.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА

- Наличие в составе амидосульфурона существенно расширяет спектр применения препарата.
- Метсульфурон-метил продлевает период гербицидного действия, создавая «экран», позволяющий подавлять следующую волну сорняков - при условии соблюдения технологии внесения.
- Наличие 3-х компонентов обеспечивает контроль широкого спектра подавляемых некоторых однолетних и многолетних сорняков.
- Широкое технологическое «окно» применения на зерновых культурах (от фазы кущения до появления второго междоузлия)
- Высокая селективность по отношению к культуре.



РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Норма расхода	Вредный объект	Способ, время обработки
Лен масличный	15 – 20 г/га	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу «ёлочки» культуры
Пшеница и ячмень яровые			Опрыскивание посевов в фазе с 3-х листьев до 2-го междоузлия культуры



СЭНТИИМ



Действующее вещество:
Клопиралид 300 г/л



Препаративная форма:
водный раствор (ВР)



Упаковка:
20 литров

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Эффективен в борьбе с однолетними двудольными и многолетними корнеотпрысковыми сорняками.

Послевсходовый гербицид системного действия для борьбы с однолетними двудольными и многолетними корнеотпрысковыми сорняками (в т.ч. виды осотов и бодяка, виды ромашек, васильков и др.) на посевах сельскохозяйственных культур.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА

- Высокоэффективен против малолетних и многолетних двудольных сорняков, особенно против таких злостных как виды осотов, горцев и ромашки.
- Технологичен в применении, благодаря препаративной (ВР) форме не требуется приготовление маточного раствора, что исключает ошибки при растворении.
- Высокая системность гербицида позволяет ему, проникая через листья, переноситься в точки роста корней и корневищ.
- Полностью уничтожает не только наземную часть, но и корневую систему сорняков
- Проявляет синергизм в смеси с другими гербицидами и идеально подходит для приготовления баковых смесей.
- Очищает поля от осота благодаря исключительному воздействию на сорняк практически во все фазы роста.
- Выпадение осадков через 2 часа не влияет на эффективность препарата.
- Широкий диапазон сроков применения.

ОГРАНИЧЕНИЯ В СЕВОБОРОТЕ

На следующий год, после применения препарата на том же поле можно выращивать любые культуры, кроме бобовых (соя, чечевица, горох, нут – ограничения в севообороте от 16 до 22 месяцев) и подсолнечника. В случае необходимости пересева культуры в год обработки (например, гибель растений от заморозков, засухи, поражения болезнями и т.п.) на том же поле, после проведения вспашки, можно выращивать зерновые, кукурузу, рапс, горчицу, капусту, лен, сахарную свеклу.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Норма расхода	Вредный объект	Способ, время обработки
Рапс, горчица	0,3-0,4 л/га	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-4 настоящих листьев культуры
Лён	0,1-0,3 л/га		Опрыскивание посевов в фазе «ёлочки» культуры и ранние фазы роста сорняков



СЭНТИУМ 600



Действующее вещество:
клопиралид 600 г/л



Препаративная форма:
водный раствор (ВР)



Упаковка:
20 литров

Послевсходовый гербицид системного действия для борьбы с однолетними двудольными и многолетними корнеотпрысковыми сорняками (в т.ч. виды осотов и бодяка, виды ромашек, васильков и др.) в посевах сельскохозяйственных культур.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА

- Клопиралид обладает высокой эффективностью в подавлении многих злостных корнеотпрысковых сорняков.
- Эталонное действие в борьбе с осотами.
- Отлично «снимает» падалицу подсолнечника, в т.ч. сортов и гибридов устойчивых к трибенурон-метилу и имидазолинонам.
- Удобство применения: жидкая препаративная форма.
- В баковых смесях проявляет синергизм с другими компонентами.

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Эффективен в борьбе с однолетними двудольными и многолетними корнеотпрысковыми сорняками.

ОГРАНИЧЕНИЯ В СЕВОБОРОТЕ

На следующий год, после применения препарата на том же поле можно выращивать любые культуры, кроме бобовых (соя, чечевица, горох, нут – ограничения в севообороте от 16 до 22 месяцев) и подсолнечника. В случае необходимости пересева культуры в год обработки (например, гибель растений от заморозков, засухи, поражения болезнями и т.п.) на том же поле, после проведения вспашки, можно выращивать зерновые, кукурузу, рапс, горчицу, капусту, лен, сахарную свеклу.



РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Норма расхода	Вредный объект	Способ, время обработки
Лен масличный	0,1 – 0,2 л/га	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу «ёлочки»
Рапс			Опрыскивание в фазе 3-4 настоящих листьев горчицы
Горчица			Опрыскивание в фазе 3-4 настоящих листьев горчицы



ЭДВАНС 2.0



Действующее вещество:
трибенурон-метил 359 г/кг
метсульфурон-метил 391 г/кг



Препаративная форма:
водно-диспергируемые
гранулы (ВДГ)



Упаковка:
500 грамм



Эффективность смеси:
Эдванс 2.0 при норме 8 г/га
+ Прогресс 0,35 л/га

Селективный гербицид для послевсходовой борьбы с однолетними и многолетними двудольными сорняками в посевах яровой пшеницы и ячменя.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА

- Увеличенная на 40% концентрация трибенурон-метила в составе продукта (в сравнении с ЭДВАНС).
- Улучшенная эффективность на двудольные сорняки (в том числе на осоты, бодяки) при тех же затратах на гектар.
- Широкий спектр контролируемых однолетних и многолетних двудольных сорных растений.
- Низкая норма внесения – удобен в применении.
- Прекрасный партнер для баковых смесей.
- Высокая селективность к культуре.

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Эффективен против однолетних и многолетних двудольных сорняков.

ОГРАНИЧЕНИЯ В СЕВОБОРОТЕ

В отношении последующих в севообороте зерновых культур ограничений для применения ЭДВАНС 2.0 не существует. На следующий год после применения ЭДВАНС 2.0 нельзя высевать чувствительные к сульфонилмочевинам культуры – свеклу и овощные. Гречиху, рапс, подсолнечник, зернобобовые культуры рекомендуется высевать после проведения глубокой осенней вспашки.

При необходимости пересева площадей, обработанных ЭДВАНС 2.0, рекомендуется высевать только яровые зерновые культуры.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Норма расхода	Вредный объект	Способ, время обработки
Пшеница яровая, ячмень яровой	6-8 г/га + ПАВ	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев - до выхода в трубку



ЭРЛИКОН



Действующее вещество:
феноксапроп-п-этил 90 г/л
клодинафоп-пропаргил 45 г/л
клоквинтоцет-мексил
34,5 г/л (антидот)



Препаративная форма:
концентрат эмульсии (КЭ)



Упаковка:
5 литров

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Эрликон эффективен в борьбе с однолетними злаковыми сорняками.

ОГРАНИЧЕНИЯ В СЕВООБОРОТЕ

Не обладает почвенным эффектом. Попадая в почву, происходит быстрое разложение гербицида на биологически неактивные компоненты. Таким образом, ограничений по севообороту для последующих культур не существует.

Высокоселективный гербицид для послевсходовой обработки пшеницы против широкого спектра однолетних злаковых сорняков.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА

- Уникальное сочетание действующих веществ граминицидов, широко применяемых в мире для защиты пшеницы.
- Высокий уровень контроля овсяга обыкновенного в посевах пшеницы.
- Широкий диапазон сроков применения, благодаря антидоту клоквинтоцетмексил.
- Нет ограничений по культурам в севообороте, быстрый распад в почве.



Эрликон 0,55 л/га: эффективность на виды просо

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Норма расхода	Вредный объект	Способ, время обработки
Пшеница яровая	0,33- 0,55 л/га	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам (независимо от фазы развития культуры). Расход рабочей жидкости 100-150 л/га.



ХИТ



Действующее вещество:
Глифосат кислоты 540 г/л



Препаративная форма:
водный раствор (ВР)



Упаковка:
20 литров

Системный гербицид сплошного действия для борьбы с широким спектром однолетних и многолетних злаковых и двудольных сорняков, древесно-кустарниковой растительностью.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА

- Широкий спектр действия и высокая эффективность в уничтожении самых злостных сорняков (осот, пырей, вьюнок полевой и др.) и древесно-кустарниковой растительности.
- Технологичные ПАВ обеспечивают быстрое проникновение действующего вещества и распределение по ключевым точкам системы сорного растения.
- Быстрое проявление симптомов гибели растения.
- Идеальный партнер для баковых смесей с гербицидами из группы 2,4-Д и сульфонилмочевин.
- Высокая дождеустойчивость.

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

ХИТ эффективен против однолетних и многолетних злаковых и двудольных сорняков, а также древесно-кустарниковой растительности.



РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Норма расхода	Вредный объект	Способ, время обработки
Пары	1,5-2,5 л/га	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста
	4,0 л/га	Горчак розовый	
Поля предназначенные под посев разных с/х культур	1,5-2,0 л/га	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной



ПАЛАДИН



Действующее вещество:
имазамокс 700 г/кг



Препаративная форма:
водно-диспергируемые
гранулы (ВДГ)



Упаковка:
1 килограмм

Уникальный гербицид для защиты бобовых и масличных культур против широкого спектра злаковых и двудольных сорных растений.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА

- Контроль злаковых и двудольных сорняков в посевах бобовых культур и подсолнечника.
- Одновременный контроль как злаковых, так и многолетних сорных растений.
- Гербицид по вегетации культуры с последующей почвенной активностью.
- Контроль второй «волны» сорняков во влажные годы.
- Нет ограничений по последствию в севообороте.

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

ПАЛАДИН эффективен против однолетних и многолетних злаковых и двудольных сорняков.

ОГРАНИЧЕНИЯ В СЕВООБОРОТЕ

В случае применения гербицида ПАЛАДИН в рекомендуемых нормах расхода ограничения по севообороту отсутствуют. На следующий год можно высевать любые культуры, за исключением сахарной свеклы. Безопасный интервал между применением гербицида и посевом сахарной свеклы – 16 месяцев.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Норма расхода	Вредный объект	Способ, время обработки
Рапс яровой (гибриды и сорта, устойчивые к имидазолинонам)	50-70 г/га + ПАВ	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 4-6 листьев культуры и ранние фазы развития сорняков. Расход рабочей жидкости 200 - 300 л/га
Горох			Опрыскивание посевов в фазе 1-3 настоящих листьев культуры в ранние фазы роста сорняков.
Соя			Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры в ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости 100 - 200 л/га
Чечевица (сорта устойчивые к имидазолинонам)	40-70 г/га + ПАВ		Опрыскивание посевов в фазе 4-6 настоящих листьев культуры в ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости 100 - 200 л/га
Подсолнечник (сорта и гибриды, устойчивые к имидазолинонам)			Опрыскивание посевов в фазе 4-6 настоящих листьев культуры в ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости 100 - 200 л/га



ПАЛАДИН 120



Действующее вещество:
Имазамокс 120 г/л



Препаративная форма:
водный раствор (ВР)



Упаковка:
5 литров

Гербицид для защиты бобовых и масличных культур против широкого спектра злаковых и двудольных сорных растений.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА

- Кросс спектр – универсальность применения: одновременная борьба с однодольными и двудольными сорняками.
- Пролонгированная гербицидная защита за счёт почвенной активности: при достаточном увлажнении активность гербицида увеличивается за счёт остаточного почвенного действия.
- Высокая биологическая и экономическая эффективность в интенсивных технологиях.

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

ПАЛАДИН 120 эффективен против однолетних и многолетних злаковых и двудольных сорняков.

ОГРАНИЧЕНИЯ В СЕВООБОРОТЕ

На следующий год можно высевать все культуры, кроме сахарной свеклы, овощей и сортов гибридов ярового и озимого рапса, не устойчивых к данному гербициду (безопасный интервал между применением гербицида и посевом свеклы, неустойчивых к гербициду сортов и гибридов рапса и овощей – 16 месяцев).

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Норма расхода	Вредный объект	Способ, время обработки
Чечевица (сорта, устойчивые к имидазолинонам)	0,3 – 0,4 л/га + ПАВ	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2 – 6 настоящих листьев культуры
Подсолнечник (сорта и гибриды, устойчивые к имидазолинонам)	0,3 – 0,4 л/га + ПАВ	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	
Соя	0,3 – 0,4 л/га + ПАВ	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 1-3 настоящих листьев культуры в ранние фазы роста сорняков
Горох при выращивании на зерно	0,3 – 0,4 л/га + ПАВ	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	
Рапс (гибриды и сорта, устойчивые к имидазолинонам)	0,3 – 0,4 л/га + ПАВ	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 настоящих листьев культуры в ранние фазы роста сорняков



ПАЛАДИН УЛЬТРА



Действующее вещество:
имазамокс 330 г/кг
имазапир 150 г/кг



Препаративная форма:
водно-диспергируемые
гранулы (ВДГ)



Упаковка:
5 кг



Эффективность Паладин Ультра,
100 г/га

Универсальный гербицид для защиты чечевицы и подсолнечника устойчивого к имидазолинонам, против широкого спектра злаковых и двудольных сорных растений.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА

- Контроль однолетних злаковых, однолетних и многолетних двудольных сорняков в посевах чечевицы и подсолнечника, устойчивых к имидазолинонам.
- Гербицид кросс-спектра – одновременный контроль как однодольных, так и двудольных сорных растений.
- Гербицид, применяемый по вегетации культуры с последующей почвенной активностью.
- Контроль второй «волны» сорняков во влажные годы.
- Эффективный контроль заразики в подсолнечнике.
- Антирезистентная программа по сорным растениям.

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

ПАЛАДИН УЛЬТРА эффективен против однолетних и многолетних злаковых и двудольных сорняков.

ОГРАНИЧЕНИЯ В СЕВОБОРОТЕ

В связи с длительным процессом разложения в почве действующего вещества имазапир, существуют следующие ограничения по севообороту: можно высевать пшеницу и рожь не ранее чем через 4 месяца; сою, ячмень, кукурузу, горох – через 9 месяцев; картофель, томаты, подсолнечник – через 19 месяцев; рапс, свеклу – через 26 месяцев.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Норма расхода	Вредный объект	Способ, время обработки
Чечевица (сорта устойчивые к имидазолинонам)	60-100 г/га+ПАВ	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 4-6 листьев культуры в ранние фазы роста сорняков.
Подсолнечник (сорта и гибриды устойчивые к имидазолинонам)			
Рапс яровой (сорта и гибриды, устойчивые к имидазолинонам)			



БЕСКАР



Действующее вещество:
тебуконазол 317 г/л
пираклостробин 83 г/л
ципроконазол 97 г/л



Препаративная форма:
концентрат суспензии (КС)



Упаковка:
5 литров

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Зерновые культуры: ржавчинные грибы (*Puccinia* spp.), септориоз (*Septoria* spp), гельминтоспориоз (*Helminthosporium* spp), фузариозы (*Fusarium* spp), сетчатая пятнистость (*Drechlerates*), полосатая пятнистость (*Drechlera* spp), темно-бурая пятнистость (*Bipolaris sorokiniana*), пиренофороз (*Pyrenophora* spp.), ринхоспориоз (*Rhynchosporium secalis*), чернь колоса (*Alternaria alternata*, *Cladosporium herbarum*, *Botrytis cinerea*), мучнистая роса (*Erysiphe graminis*).

Зернобобовые культуры: фузариоз (*Fusarium* spp.), аскохитоз (*Ascochyta* spp.), антракноз (*Colletotrichum* spp.), ржавчина (*Uromyces viciae fabae*) и др.

Трёхкомпонентный системный фунгицид с уникальной комбинацией из действующих веществ групп триазолов и стробилуринов для защиты зерновых и зернобобовых культур от широкого спектра заболеваний.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА

- Оригинальная комбинация трёх наиболее эффективных молекул обеспечивает максимально широкий спектр подавляемых патогенов зерновых, бобовых и прочих культур, что обуславливает универсальность препарата.
- Сочетание двух молекул триазоловой группы с молекулой стробилуриновой группы - отличный инструмент антирезистентных программ в системе комплексной защиты культур.
- Обладает продолжительным защитным, лечащим и искореняющим действием.
- Высокая скорость проникновения компонентов препарата и особенности их механизма действия обуславливают максимально быстрое начальное действие по подавлению патогенов.
- Быстро переносится по растению, легко передвигается в новоформирующиеся части растения, обеспечивая их надёжную защиту.
- Оптимальный подбор компонентов и их количественный баланс обеспечивает непревзойденную эффективность против ключевых заболеваний культур: ржавчин, септориозов, мучнистой росы и др.
- Обладает росто- и иммуностимулирующим, антистрессовым свойствами при неблагоприятных погодных и прочих условиях.

ПЕРИОД ЗАЩИТНОГО ДЕЙСТВИЯ

В оптимальных условиях период защитного действия составляет в течении трех-четырех недель в зависимости от складывающихся погодных условий, фазы развития растений и степени инфицированности.



КОНТРОЛЬ



БЕКАР 0,25 л/га

Сохранность флагового листа яровой пшеницы, 26 день после обработки

СКОРОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Препарат поглощается надземной частью растения в течении часа после применения.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Норма расхода	Вредный объект	Способ, время обработки
Пшеница яровая	0,25 л/га	Бурая, желтая, стеблевая ржавчины, септориоз, гельминтспориозные пятнистости, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации.
Ячмень яровой	0,25 л/га	Желтая, стеблевая ржавчины, септориоз, гельминтспориозные пятнистости, мучнистая роса	
Чечевица	0,25 – 0,35 л/га	Фузариозное увядание, антракноз, ржавчина, аскохитоз, серая гниль, мучнистая роса	
Соя	0,25 – 0,35 л/га		



БАЙТАН



Действующее вещество:

тебуконазол 397 г/л
триадименол 97 г/л



Препаративная форма:
концентрат суспензии (КС)



Упаковка:
5 литров

Системный фунгицид, обладающий профилактическим и лечебно-искореняющим действием для контроля важнейших заболеваний с/х культур: пшеница, ячмень, лен, подсолнечник, чечевица, горох.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА

- Высокая скорость проникновения компонентов препарата и особенности их механизма действия обуславливают максимально быстрое начальное действие по подавлению патогенов.
- Продолжительный период защитного действия за счет синергизма двух молекул.
- Отличная проникающая способность и распределение препарата по листовой поверхности обеспечивают хорошую защиту культуры от проникновения и развития патогена.

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Зерновые культуры: ржавчинные грибы (*Puccinia* spp.), мучнистая роса (*Erysiphe graminis*), септориоз (*Septoria* spp), гельминтоспориоз (*Helminthosporium* spp.), фузариозы (*Fusarium* spp), сетчатая пятнистость (*Drechlera teres*), полосатая пятнистость (*Drechlera* spp), темно-бурая пятнистость (*Bipolaris sorokiniana*), пиренофороз (*Pyrenophora* spp.), ринхоспориоз (*Rhynchosporium secalis*), чернь колоса (*Alternaria alternata*, *Cladosporium herbarum*, *Botrytis cinerea*) и др.

Зернобобовые культуры: фузариоз (*Fusarium* spp.), аскохитоз (*Ascochyta* spp.), антракноз (*Colletotrichum* spp.), ржавчина (*Uromyces fabae*) и др.

Лен масличный: фузариозное увядание (*Fusarium* spp.), аскохитоз (*Ascochyta* spp.), антракноз (*Colletotrichum* spp.), ржавчина льна, пероноспороз, фомоз и др.

Подсолнечник: мучнистая роса, ложно-мучнистая роса, фомоз, фомопсис, септориоз, альтернариоз, бурая пятнистость, склеротиниоз, белая гниль, серая гниль, аскохитоз.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Норма расхода	Вредный объект	Способ, время обработки
Пшеница яровая	0,2 – 0,25 л/га	Бурая, желтая, стеблевая ржавчина, септориоз, гельминтоспориозные пятнистости	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 100 – 200 л/га
Ячмень яровой	0,2 – 0,25 л/га	Стеблевая, желтая ржавчина, септориоз, гельминтоспориозные пятнистости	
Лен	0,25 – 0,35 л/га	Альтернариоз, фузариозное увядание, антракноз, фомоз, аскохитоз	
Подсолнечник	0,25 – 0,35 л/га	Мучнистая роса, ложно-мучнистая роса, фомоз, фомопсис, септориоз, альтернариоз, бурая пятнистость, склеротиниоз, белая гниль, серая гниль, аскохитоз	
Чечевица	0,25 – 0,35 л/га	Ржавчина, аскохитоз, антракноз, мучнистая роса, фузариоз, серая гниль	
Горох	0,25 – 0,35 л/га	Ржавчина, аскохитоз, антракноз, мучнистая роса, фузариоз, серая гниль	



VAPRO



Действующее вещество:

тебуконазол 500 г/л
карбендазим 50 г/л



Препаративная форма:
концентрат суспензии (КС)



Упаковка:
5 литров

Двухкомпонентный фунгицид системного действия для превентивной и лечебной обработки посевов зерновых, зернобобовых и масличных культур.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА

- Синергизм, обусловленный взаимодополняющим действием двух молекул разного химического класса.
- Карбендазим высокоэффективен против специфических заболеваний классов *Alternaria*, *Helminthosporium*, *Phoma*, *Rhizoctonia*, *Sclerotinia*, *Septoria* и др.
- Тебуконазол обеспечивает отличный контроль большинства грибковых заболеваний, таких как ржавчина, септориоз листа и колоса, фузариоз колоса и листьев.
- Быстрое проникновение в растение и ярко выраженный стоп-эффект в ранней фазе развития заболевания.

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Зерновые культуры: ржавчинные грибы (*Puccinia* spp.), септориоз (*Septoria* spp), гельминтоспориоз (*Helminthosporium* spp.), фузариозы (*Fusarium* spp), сетчатая пятнистость (*Drechlera teres*), полосатая пятнистость (*Drechlera* spp), темно-бурая пятнистость (*Bipolaris sorokiniana*), пиренофороз (*Pyrenophora* spp.), ринхоспориоз (*Rhynchosporium secalis*), чернь колоса (*Alternaria alternata*, *Cladosporium herbarum*, *Botrytis cinerea*), мучнистая роса (*Erysiphe graminis*) и др.

Зернобобовые культуры: фузариоз (*Fusarium* spp.), аскохитоз (*Ascochyta* spp.), антракноз (*Colletotrichum* spp.), ржавчина (*Uromyces viciaefabae*) и др.

Лён: аскохитоз (*Ascochyta* spp.), антракноз льна (*Colletotrichum lini*), ржавчина (*Melampsora lini* Desm) и др.

ПЕРИОД ЗАЩИТНОГО ДЕЙСТВИЯ

Биологический эффект продолжается в течение трех недель в зависимости от погодных условий и степени инфицирования.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Норма расхода	Вредный объект	Способ, время обработки
Пшеница яровая	0,25 л/га	Ржавчина бурая, стеблевая, септориоз, гельминтоспориоз	Опрыскивание в период вегетации
Ячмень яровой		Стеблевая, желтая ржавчина, септориоз, гельминтоспорозные пятнистости	
Рапс*		Альтернариоз, фомоз, склеротиниоз, мучнистая роса, росторегулирующее действие	
Лён, соя, чечевица, Горох*	0,25-0,3 л/га	Фузариозное увядание, антракноз, ржавчины, аскохитоз	

* – в стадии расширения регистрации на культуру



ГАРДА



Действующее вещество:
тебуконазол 387 г/л
альфа-циперметрин 47 г/л
тиаметоксам 67 г/л



Препаративная форма:
концентрат суспензии (КС)



Упаковка:
5 литров

Комбинированный системный препарат с инсектицидными и фунгицидными свойствами для одновременного контроля наиболее значимых вредителей и болезней по вегетации зерновых и бобовых культур.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА

- Уникальное сочетание инсекто-фунгицидных веществ обеспечивает контроль и защиту культуры от комплекса вредителей и болезней.
- Готовое решение – в одной канистре: уникальный комбинированный состав препарата из инсекто-фунгицидных веществ помогает исключить ошибки при приготовления баковых смесей.
- Сочетание молекул в составе препарата позволяют проводить качественную профилактическую обработку.
- Отлично подходит для применения в интегрированных программах защиты как страховой фунгицид и инсектицид.
- «Нокдаун-эффект» благодаря альфа-циперметрину (обладает контактным, кишечным и репеллентным действием) – вредители перестают питаться уже через несколько часов после обработки.

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Зерновые культуры: ржавчинные грибы (*Puccinia* spp), мучнистая роса (*Erysiphe graminis*), септориоз (*Septoria* spp), гельминтоспориоз (*Helminthosporium* spp.), фузариозы (*Fusarium* spp), сетчатая пятнистость (*Drechlera teres*), полосатая пятнистость (*Drechlera* spp), темно-бурая пятнистость (*Bipolaris sorokiniana*), пиренофороз (*Pyrenophora* spp.), ринхоспориоз (*Rhynchosporium secalis*), чернь колоса (*Alternaria alternata*, *Cladosporium herbarum*, *Botrytis cinerea*) и др.

Зернобобовые культуры: фузариоз (*Fusarium* spp.), аскохитоз (*Ascochyta* spp.), антракноз (*Colletotrichum* spp.), ржавчина (*Uromyces viciaefabae*) и др.

Вредители: инсектицид широкого спектра действия, эффективен против чешуекрылых (*Lepidoptera*), равнокрылых (*Homoptera*), жесткокрылых (*Coleoptera*), двукрылых (*Diptera*), полужесткокрылых (*Hemiptera*) и других вредителей.



Септориозно-гельминтоспориозное поражение колосковых чешуек яровой пшеницы.



Пшеничный трипс (*Haplothrips tritici*): питание личинок внутри колоса.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Норма расхода	Вредный объект	Способ, время обработки
Пшеница яровая	0,25-0,35 л/га	Ржавчины (бурая, желтая, стеблевая), септориоз, гельминтоспориозные пятнистости, мучнистая роса, злаковые (гессенская, шведская) мухи, пшеничный трипс, злаковая тля, хлебные блошки, клоп вредная черепашка, серая зерновая совка	Опрыскивание в период вегетации культуры
Ячмень яровой	0,25-0,35 л/га	Стеблевая, желтая ржавчина, септориоз, гельминтоспориозные пятнистости, мучнистая роса; хлебная пьявица, злаковые (шведская, гессенская) мухи, хлебные блошки	
Чечевица	0,3-0,4 л/га	Аскохитоз, фузариоз, антракноз, серая гниль, ржавчина, мучнистая роса, клубеньковые долгоносики, гороховая и люцерновая тли, луговой мотылек	
Горох	0,3-0,4 л/га		



КАПРИ



Действующее вещество:
тебуконазол 350 г/л
триадименол 70 г/л
пираклостробин 80 г/л



Препаративная форма:
концентрат суспензии (КС)



Упаковка:
5 литров



Высокоэффективный комбинированный препарат, содержащий комбинацию трех фунгицидных действующих веществ триазоловой и стробилуриновой группы, для защиты посевов зерновых, масличных и бобовых культур от комплекса заболеваний в период вегетации.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА

- Оригинальная комбинация системных молекул тебуконазола и триадименола и стабильного пираклостробина обеспечивают комплексную защиту растений на всех этапах развития культуры.
- Сочетание трех молекул из двух химических классов, триазолов и стробилуринов, в составе препарата позволяет избежать развития резистентности у патогенов.
- Широкий спектр контролируемых заболеваний, в том числе эталонная защита от ржавчинных грибов.
- Сочетание трёх активных ингредиентов с профилактическим и лечащим действием надёжно обеспечивает продолжительный контроль заболеваний.

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Зерновые культуры: ржавчинные грибы (*Puccinia* spp.), мучнистая роса (*Erysiphe graminis*), септориоз (*Septoria* spp), гельминтоспориоз (*Helminthosporium* spp.), фузариозы (*Fusarium* spp), сетчатая пятнистость (*Drechlera teres*), полосатая пятнистость (*Drechlera* spp), темно-бурая пятнистость (*Bipolaris sorokiniana*), пиренофороз (*Pyrenophora* spp.), ринхоспориоз (*Rhynchosporium secalis*), чернь колоса (*Alternaria alternata*, *Cladosporium herbarum*, *Botrytis cinerea*) и др.

Зернобобовые культуры: фузариоз (*Fusarium* spp.), аскохитоз (*Ascochyta* spp.), антракноз (*Colletotrichum* spp.), ржавчина (*Uromyces viciae-fabae*) и др.

Лен масличный: фузариозное увядание (*Fusarium* spp.), аскохитоз (*Ascochyta* spp.), антракноз (*Colletotrichum* spp.), ржавчина льна, пероноспороз, фомоз и др.

Подсолнечник: мучнистая роса, ложная мучнистая роса, фомоз, фомопсис, септориоз, альтернариоз, бурая пятнистость, склеротиниоз, белая гниль, серая гниль, аскохитоз.



РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Норма расхода	Вредный объект	Способ, время обработки
Пшеница яровая	0,2-0,3 л/га	Бурая, желтая, стеблевая ржавчина, септориоз, гельминтоспориозные пятнистости	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 100-200 л/га
Ячмень яровой	0,2-0,3 л/га	Стеблевая, желтая ржавчина, септориоз, гельминтоспориозные пятнистости	
Лен	0,25-0,35 л/га	Альтернариоз, фузариозное увядание, антракноз, фомоз, аскохитоз	
Подсолнечник	0,25-0,35 л/га	Мучнистая роса, ложно-мучнистая роса, фомоз, фомопсис, септориоз, альтернариоз, бурая пятнистость, склеротиниоз, белая гниль, серая гниль, аскохитоз	
Чечевица	0,25-0,35 л/га	Ржавчина, аскохитоз, антракноз, мучнистая роса, фузариоз, серая гниль	
Горох	0,25-0,35 л/га	Ржавчина, аскохитоз, антракноз, мучнистая роса, фузариоз, серая гниль	
Нут	0,25-0,35 л/га	Ржавчина, аскохитоз, антракноз, фузариоз, серая гниль, мучнистая роса	



КОНСОРТ



Действующее вещество:
тебуконазол 200 г/л
карбендазим 300 г/л



Препаративная форма:
концентрат суспензии (КС)



Упаковка:
5 литров

Системный фунгицид для защиты посевов зерновых, зернобобовых культур и льна масличного от листостебельных инфекций.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА


- Широкий спектр контроля патогенов и надежная защита листового аппарата.
- Высокая эффективность против возбудителей гельминтоспориозных пятнистостей зерновых.
- Обладает профилактическим, лечебным и искореняющим действием.
- Быстрое проникновение препарата в растение останавливает развитие инфекции и обеспечивает дальнейшую защиту.
- Как представитель класса бензимидазолов, карбендазим обладает положительным ростостимулирующим действием.

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Зерновые культуры: ржавчинные грибы (*Puccinia* spp.), септориоз (*Septoria* spp), гельминтоспориоз (*Helminthosporium* spp.), фузариозы (*Fusarium* spp), сетчатая пятнистость (*Drechlera teres*), полосатая пятнистость (*Drechlera* spp), темно-бурая пятнистость (*Bipolaris sorokiniana*), пиренофороз (*Pyrenophora* spp.), ринхоспориоз (*Rhynchosporium secalis*), чернь колоса (*Alternaria alternata*, *Cladosporium herbarum*, *Botrytis cinerea*), мучнистая роса (*Erysiphe graminis*).

Бобовые культуры: фузариоз (*Fusarium* spp.), аскохитоз (*Ascochyta* spp.), антракноз (*Colletotrichum* spp.), ржавчина (*Uromyces viciae-fabae*) и др.

Лен: аскохитоз (*Ascochyta* spp.), антракноз льна (*Colletotrichum lini*), ржавчина (*Melampsora lini* Desm) и др.



Развитие бурой листовой ржавчины (*Puccinia recondite*) на яровой пшенице

ПЕРИОД ЗАЩИТНОГО ДЕЙСТВИЯ

Защитное действие культуры в течение трех-четырех недель, в зависимости от складывающихся погодных условий, фазы развития растений и степени инфицированности растений.



Стеблевая линейная ржавчина (*Puccinia graminis*) яровой пшеницы.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Норма расхода	Вредный объект	Способ, время обработки
Пшеница яровая	0,4 – 0,5 л/га	Ржавчины (бурая, стеблевая, желтая), септориоз, гельминтоспориозные пятнистости, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации
Ячмень яровой	0,4 – 0,5 л/га	Стеблевая, желтая ржавчины, септориоз, гельминтоспориозные пятнистости, мучнистая роса	
Лен	0,5 – 0,6 л/га	Альтернариоз, фузариозное увядание, антракноз, фомоз, аскохитоз	
Соя	0,5 – 0,6 л/га	Аскохитоз, фузариоз, антракноз, серая гниль, мучнистая роса	
Горох	0,5 – 0,6 л/га		



ЛАНТУС

**Действующее вещество:**

флутриафол 200 г/л
 тиофанат-метил 200 г/л
 металаксил 100 г/л



Препаративная форма:
 концентрат суспензии (КС)



Упаковка:
 5 литров

Эффективный комбинированный фунгицид для защиты яровых зерновых культур, чечевицы и льна масличного от комплекса болезней.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА

- Комбинация трех действующих веществ, обладающих системным действием, позволяет защищать все части растений.
- Эффективная комбинация действующих веществ гарантирует контроль широкого спектра заболеваний.
- Наличие в составе металаксила оказывает мощное системное действие.
- Антираезистентное решение благодаря наличию в составе веществ из разных химических классов (триазолы, бензимидазолы, фениламиды).
- Тиофанат-метил в составе препарата обеспечивает ярко выраженный озеленяющий эффект.

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Зерновые культуры: ржавчинные грибы (*Puccinia* spp.), септориоз (*Septoria* spp), гельминтоспориоз (*Helminthosporium* spp.), фузариозы (*Fusarium* spp), сетчатая пятнистость (*Drechlera teres*), полосатая пятнистость (*Drechlera* spp), темно-бурая пятнистость (*Bipolaris sorokiniana*), пиренофороз (*Pyrenophora* spp.), ринхоспориоз (*Rhynchosporium secalis*), чернь колоса (*Alternaria alternata*, *Cladosporium herbarum*, *Botrytis cinerea*), мучнистая роса (*Erysiphe graminis*).

Зернобобовые культуры: фузариоз (*Fusarium* spp.), аскохитоз (*Ascochyta* spp.), антракноз (*Colletotrichum* spp.), ржавчина (*Uromyces viciae-fabae*) и др.

Лен: аскохитоз (*Ascochyta* spp.), антракноз льна (*Colletotrichum lini*), ржавчина (*Melampsora lini* Desm) и др.

ПЕРИОД ЗАЩИТНОГО ДЕЙСТВИЯ

Препарат обладает лечебным и профилактическим действием и обеспечивает защиту в течение трех-четырёх недель, в зависимости от складывающихся погодных условий, фазы развития растений и степени инфицированности растений.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Норма расхода	Вредный объект	Способ, время обработки
Пшеница и ячмень яровые	0,25-0,35 л/га	Бурая, желтая, стеблевая ржавчины, септориоз, гельминтоспориозные пятнистости	Опрыскивание в период вегетации
Лен масличный	0,3-0,4 л/га	Альтернариоз, фомоз, пероноспороз, антракноз	
Чечевица	0,3-0,4 л/га	Аскохитоз, антракноз, склеротиния, альтернариоз, фомоз	



ЛАНТУС ФОРТЕ



Действующее вещество:

боскалид 57 г/л
тиофанат-метил 193 г/л
флутриафол 247 г/л



Препаративная форма:
концентрат суспензии (КС)



Упаковка:
5 литров

Универсальный трёхкомпонентный системный фунгицид против возбудителей болезней зерновых, зернобобовых и масличных культур.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА

- Профилактика резистентности за счет трех действующих веществ из разных химических классов.
- Широкий спектр контроля заболеваний на различных культурах.
- Универсальность.
- Наличие в составе действующего вещества боскалид позволяет эффективно бороться с альтернариозом и склеротинией.
- Оказывает мощное профилактическое и лечебное действие.
- Наличие в составе препарата флутриафола обеспечивает быстрое начальное фунгицидное действие.
- Способен эффективно защищать новообразующиеся вегетативные и генеративные органы.

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Зерновые культуры: ржавчинные грибы (*Puccinia* spp.), септориоз (*Septoria* spp), гельминтоспориоз (*Helminthosporium* spp.), фузариозы (*Fusarium* spp), сетчатая пятнистость (*Drechslera teres*), полосатая пятнистость (*Drechslera* spp), темно-бурая пятнистость (*Bipolaris sorokiniana*), пиренофороз (*Pyrenophora* spp.), ринхоспориоз (*Rhynchosporium secalis*), чернь колоса (*Alternaria alternata*, *Cladosporium herbarum*, *Botrytis cinerea*), мучнистая роса (*Erysiphe graminis*).

Зернобобовые культуры: фузариоз (*Fusarium* spp.), аскохитоз (*Ascochyta* spp.), антракноз (*Colletotrichum* spp.), ржавчина (*Uromyces viciae-fabae*) и др.

Лен: аскохитоз (*Ascochyta* spp.), антракноз льна (*Colletotrichum lini*), ржавчина (*Melampsora lini* Desm) и др.

ПЕРИОД ЗАЩИТНОГО ДЕЙСТВИЯ

Обеспечивает защитное действие культуры в течение трех-четырех недель, в зависимости от складывающихся погодных условий, фазы развития растений и степени инфицированности растений.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Норма расхода	Вредный объект	Способ, время обработки
Пшеница и ячмень яровые	0,4-0,5 л/га	Бурая, желтая, стеблевая ржавчины, септориоз, гельминтоспориозные пятнистости	Опрыскивание в период вегетации
Лен масличный	0,4-0,5 л/га	Альтернариоз, фомоз, пероноспороз, антракноз	
Чечевица	0,4-0,5 л/га	Аскохитоз, антракноз, склеротиния, альтернариоз, фомоз	



ЛИПА



Действующее вещество:
тебуконазол 417 г/л
тиаметоксам 83 г/л



Препаративная форма:
концентрат суспензии (КС)



Упаковка:
5 литров

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Ржавчинные грибы (*Puccinia* spp.), септориоз (*Septoria* spp), гельминтоспориоз (*Helminthosporium* spp.), сетчатая пятнистость (*Drechlerateres*), темно-бурая пятнистость (*Bipolaris sorokiniana*), пиренофороз (*Pyrenophora* spp.), ринхоспориоз (*Rhynchosporium secalis*), мучнистая роса (*Erysiphe graminis*).

Благодаря наличию в составе препарата тиаметоксама, имеет высокую эффективность против вредителей семейства чешуекрылые (*Lepidoptera*), жесткокрылые (*Coleoptera*), двукрылые (*Diptera*), бахромчатокрылые (*Thysanoptera*) и прочие.

Универсальный комбинированный системный препарат с инсектицидными и фунгицидными свойствами для защиты зерновых культур от вредителей и болезней.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА

- Одновременная защита зерновых культур от основных вредителей и болезней.
- Простота применения и технологичность (исключение ошибок при приготовлении баковой смеси).
- Обеспечивает эффективное лечебное и пролонгированное профилактическое действие против заболеваний и длительную защиту против вредителей.
- Удобство в применении и возможность более равномерного распределения материально – технических и трудовых ресурсов.
- Высокая экономическая эффективность
- Лучшее решение для интенсивной технологии возделывания зерновых культур.



ПЕРИОД ЗАЩИТНОГО ДЕЙСТВИЯ

В течении 3-4 недель с момента обработки, в зависимости от погодных условий, фазы развития растений, степени инфицированности и вида вредителя.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Норма расхода	Вредный объект	Способ, время обработки
Пшеница яровая	0,3 л/га	Бурая, желтая, стеблевая ржавчина, септориоз, гельминтоспориозные пятнистости, блошки, пшеничный трипс, злаковые (гессенская, шведская) мухи, клоп вредная черепашка	Опрыскивание в период вегетации
Ячмень яровой	0,3 л/га	Стеблевая, желтая ржавчина, септориоз, гельминтоспориозные пятнистости, блошки, трипсы, пьявица, шведская муха	



РЕМИ 2.0



Действующее вещество:
тебуконазол 170 г/л
триадименол 47 г/л



Препаративная форма:
концентрат суспензии (КС)



Упаковка:
5 литров

Двухкомпонентный системный фунгицид с широким спектром действия для защиты зерновых, масличных и бобовых культур.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА

- Оригинальная комбинация двух молекул класса триазолы обеспечивает эффективное лечебное и пролонгированное профилактическое действие.
- Наличие в составе триадименола обуславливает более продолжительный защитный период.
- Обладает прекрасным стимулирующим действием, выраженным озеленяющим эффектом.
- Значительно повышает антистрессовые свойства, засухо- и морозоустойчивость.

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Эффективен против основных болезней зерновых культур – ржавчинные грибы (*Puccinia* spp.), септориоз (*Septoria* spp), гельминтоспориоз (*Helminthosporium* spp.), фузариозы (*Fusarium* spp), сетчатая пятнистость (*Drechlerateres*), полосатая пятнистость (*Drechlera* spp), темно-бурая пятнистость (*Bipolaris sorokiniana*), пиренофороз (*Pyronophora* spp.), ринхоспориоз (*Rhynchosporium secalis*), чернь колоса (*Alternaria alternata*, *Cladosporium herbarum*, *Botrytis cinerea*), мучнистая роса (*Erysiphe graminis*)

ПЕРИОД ЗАЩИТНОГО ДЕЙСТВИЯ

Биологический эффект продолжается в течение 3-4 недель, в зависимости от погодных условий, фазы развития растений и степени инфицирования.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Норма расхода	Вредный объект	Способ, время обработки
Пшеница яровая	0,4-0,6 л/га	Ржавчина (бурая, стеблевая, желтая), септориоз, гельминтоспориозные пятнистости, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации.
Ячмень яровой	0,4-0,6 л/га	Ржавчина (стеблевая, желтая), септориоз, гельминтоспориозные пятнистости, мучнистая роса	
Лен	0,4-0,6 л/га	Альтернариоз, фузариозное увядание, антракноз, аскохитоз, фомоз	
Чечевица	0,4-0,6 л/га	Аскохитоз, антракноз, фузариоз, серая гниль, ржавчина, мучнистая роса	



САНСЭР



Действующее вещество:

тебуконазол 381 г/л
флутриафол 117 г/л



Препаративная форма:
концентрат суспензии (КС)



Упаковка:
5 литров

Эффективный системный двухкомпонентный фунгицид пролонгированного действия для контроля широкого спектра заболеваний зерновых, масличных и бобовых культур.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА

- Гарантия сохранности потенциала урожая на всех этапах применения фунгицида.
- Обеспечение высокого качества зерна = натура, клейковина, ИДК.
- Прекрасно вписывается в систему интегрированной защиты посевов в качестве страхового фунгицида.
- Обеспечивает высокоэффективное лечебное и пролонгированное профилактическое действие.
- Эффективная комбинация действующих веществ гарантирует контроль широкого спектра заболеваний.

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Зерновые культуры: ржавчинные грибы (*Puccinia* spp.), септориоз (*Septoria* spp), гельминтоспориоз (*Helminthosporium* spp.), фузариозы (*Fusarium* spp), сетчатая пятнистость (*Drechlera teres*), полосатая пятнистость (*Drechlera* spp), темно-бурая пятнистость (*Bipolaris sorokiniana*), пиренофороз (*Pyrenophora* spp.), ринхоспориоз (*Rhynchosporium secalis*), чернь колоса (*Alternaria alternata*, *Cladosporium herbarum*, *Botrytis cinerea*), мучнистая роса (*Erysiphe graminis*).

Зернобобовые культуры: фузариоз (*Fusarium* spp.), аскохитоз (*Ascochyta* spp.), антракноз (*Colletotrichum* spp.), ржавчина (*Uromyces viciaefabae*) и др.

ПЕРИОД ЗАЩИТНОГО ДЕЙСТВИЯ

Биологический эффект продолжается в течение трех-четырех недель в зависимости от погодных условий и степени инфицирования.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Норма расхода	Вредный объект	Способ, время обработки
Пшеница яровая	0,25 л/га	Ржавчина бурая, желтая, септориоз стеблевая, гельминтоспориозные пятнистости	Опрыскивание в период вегетации
Ячмень яровой			
Лен*	Фузариозное увядание, антракноз, ржавчины, полиспороз, аскохитоз		
Чечевица*	0,25 – 0,35 л/га	Фузариозное увядание, антракноз, ржавчины, аскохитоз, ростостимулирующее действие	
Горох*			
Соя*			

* – в стадии расширения регистрации на культуру



САНСЭР КОМБИ



Действующее вещество:

тебуконазол 337 г/л
флутриафол 78 г/л
клотианидин 73 г/л



Препаративная форма:
концентрат суспензии (КС)



Упаковка:
5 литров



Комбинированный системный препарат с инсектицидными и фунгицидными свойствами для одновременного контроля наиболее значимых вредителей и болезней по вегетации зерновых культур.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА

- Одновременный контроль основных листовых заболеваний и вредителей зерновых культур.
- Удобство в применении и возможность более равномерного и экономичного распределения материально-технических и трудовых ресурсов в сезоне.
- Исключение ошибок при приготовлении баковых смесей.
- Прекрасно вписывается в систему интегрированной защиты посевов в качестве страхового фунгицида и инсектицида.
- Обеспечивает эффективное лечебное и пролонгированное профилактическое действие против заболеваний и длительную защиту против вредителей.
- Помимо фунгицидной защиты, одновременно контролирует скрытостеблевые вредители (гессенская (*Mayetiola destructor*) муха, шведская (*Oscinella frit*) муха), пшеничный трипс (*Haplothrips tritici*) и др. вредители.

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Эффективен против основных болезней зерновых культур. Благодаря наличию инсектицида клотианидина имеет эффективность против вредителей из семейств жесткокрылых (Coleoptera), равнокрылых (Homoptera) и двукрылых (Diptera).

ПЕРИОД ЗАЩИТНОГО ДЕЙСТВИЯ

В течение 3-4 недель с момента обработки.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Норма расхода	Вредный объект	Способ, время обработки
Пшеница и ячмень яровые	0,25 – 0,35 л/га	Бурая, желтая, стеблевая ржавчина, септориоз, гельминтоспориозные пятнистости, блошки, гессенская муха, трипсы; на пшенице: клоп вредная черепашка, серая зерновая совка, хлебные жуки	Опрыскивание в период вегетации



ТОПРЕС



Действующее вещество:

тиофанат-метил 250 г/л
тебуконазол 167 г/л
триадименол 43 г/л



Препаративная форма:
концентрат суспензии (КС)



Упаковка:
5 литров

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

ТОПРЕС эффективен против основных болезней зерновых культур – ржавчинные грибы (*Puccinia* spp.), септориоз (*Septoria* spp.), гельминтоспориоз (*Helminthosporium* spp.), фузариозы (*Fusarium* spp), сетчатая пятнистость (*Drechlera teres*), полосатая пятнистость (*Drechlera* spp.), темно-бурая пятнистость (*Bipolaris sorokiniana*), пиренофороз (*Pyrenophora* spp), ринхоспориоз (*Rhynchosporium secalis*), чернь колоса (*Alternaria alternata*, *Cladosporium herbarum*, *Botrytis cinerea*), мучнистая роса (*Erysiphe graminis*) и др.

Уникальный трехкомпонентный системный фунгицид, обладающий профилактическим и лечебно-искореняющим действием для контроля важнейших заболеваний зерновых культур.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА

- Уникальное сочетание трех молекул из разных химических групп (бензимидазолы, триазолы).
- Высокий уровень профилактической и лечебно-искореняющей биологической активности против ключевых болезней.
- Многостороннее фунгицидное действие на листья и колос культуры.
- Пролонгированное защитное действие.
- Широкий спектр возбудителей на различных культурах: ржавчина желтая, мучнистая роса, септориоз, ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, гельминтоспориоз, фузариоз колоса, ломкость стеблей, фомоз и оидиум.
- Благодаря наличию триадименола и тиофанат-метила обладает ярко выраженным озеленяющим эффектом и повышенной засухоустойчивостью.





Первые признаки проявления пятнистостей на ранних этапах развития яровой пшеницы (фаза: кущение-выход в трубку)



ПЕРИОД ЗАЩИТНОГО ДЕЙСТВИЯ

Биологический эффект продолжается в течение трех-четырех недель в зависимости от погодных условий и степени инфицирования.

СКОРОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Препарат проникает в растение в течение 3 часов с момента обработки.

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМИ ПЕСТИЦИДАМИ

Препарат совместим с большинством гербицидов и инсектицидов, за исключением сильнощелочных веществ. Однако в каждом конкретном случае необходима предварительная проверка на химическую совместимость.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Норма расхода	Вредный объект	Способ, время обработки
Пшеница и ячмень яровые	0,3 – 0,5 л/га	Бурая, желтая, стеблевая ржавчина, септориоз, гельминтоспориозные	Опрыскивание в период вегетации



ЭМИТИ



Действующее вещество:

тебуконазол 317 г/л
флутриафол 93 г/л
азоксистробин 90 г/л



Препаративная форма:
концентрат суспензии (КС)



Упаковка:
5 литров

Высокоэффективная трехкомпонентная комбинация фунгицидов триазоловой и стробилуриновой группы.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА

- Сочетание высокоэффективных действующих веществ.
- Усиление иммуномодулирующих и антитрессовых показателей растения.
- Комбинированное контактно-системное действие благодаря сочетанию различных фунгицидных классов.
- Эффективный контроль широкого спектра патогенных грибов на всех стадиях развития культуры.
- Полноценная реализация основных показателей урожайности = число продуктивных стеблей, число зерен в колосе, масса 1000 зерен.

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Зерновые культуры: ржавчинные грибы (*Puccinia* spp.), септориоз (*Septoria* spp), гельминтоспориоз (*Helminthosporium* spp.), фузариозы (*Fusarium* spp), сетчатая пятнистость (*Drechlera teres*), полосатая пятнистость (*Drechlera* spp), темно-бурая пятнистость (*Bipolaris sorokiniana*), пиренофороз (*Pyrenophora* spp.), ринхоспориоз (*Rhynchosporium secalis*), чернь колоса (*Alternaria alternata*, *Cladosporium herbarum*, *Botrytis cinerea*), мучнистая роса (*Erysiphe graminis*) и др.

Зернобобовые культуры: фузариоз (*Fusarium* spp.), аскохитоз (*Ascochyta* spp.), антракноз (*Colletotrichum* spp.), ржавчина (*Uromyces viciae-fabae*) и др.

Лен: аскохитоз (*Ascochyta* spp.), антракноз льна (*Colletotrichum lini*), ржавчина (*Melampsora lini* Desm) и др.



Чечевица: развитие ржавчины (*Uromyces viciae-craccae* Const.)

ПЕРИОД ЗАЩИТНОГО ДЕЙСТВИЯ

Биологический эффект продолжается в течение трех недель в зависимости от погодных условий и степени инфицирования.



Без обработки



Эмити 0, 35 л/га

Ржавчина гороха (*Uromyces pisi*)

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Норма расхода	Вредный объект	Способ, время обработки
Пшеница яровая, Ячмень яровой, Лен	0,25 л/га	Ржавчина бурая, желтая, стеблевая, септориоз, гельминтоспориозные пятнистости	Опрыскивание в период вегетации культуры
Подсолнечник	0,3-0,4 л/га	Ржавчина, аскохитоз, фомоз, альтернариоз, склеротиниоз, мучнистая роса	
Чечевица Соя Нут Горох	0,25-0,35 л/га	Аскохитоз, ржавчина, антракноз, фузариоз, мучнистая роса	



АГРИС



Действующее вещество:
тиаметоксам 57 г/л
имidakлоприд 210 г/л
лямбда-цигалотрин 105 г/л



Препаративная форма:
концентрат суспензии (КС)



Упаковка:
5 литров

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Инсектицид широко спектра действия, активен в борьбе с жесткокрылыми (Coleoptera), равнокрылыми (Homoptera), двукрылыми (Diptera), чешуекрылыми (Lepidoptera).

Высокоэффективный трехкомпонентный инсектицид пролонгированного контактно-системного действия на основе двух химических классов.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА

- Единственная трехкомпонентная комбинация самых популярных молекул.
- Быстрый нокдаун-эффект благодаря наличию лямбда-цигалотрина.
- Продолжительное действие благодаря двум неоникотиноидам тиаметоксам, имidakлоприд.
- Быстрое уничтожение вредителей и продолжительный защитный период.



Клоп вредная черепашка (*Eurygaster integriceps* Put.)

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Норма расхода	Вредный объект	Способ, время обработки
Пшеница яровая	0,05-0,06 л/га	Блошки, трипсы, серая зерновая совка, клоп вредная черепашка, гессенская муха и хлебные жуки	Опрыскивание в период вегетации.
Картофель		Колорадский жук	
Рапс	0,05-0,06 л/га	Рапсовый цветоед, капустная белянка, луговой мотылек	
	0,1 л/га	Капустная моль*	
Чечевица*	0,05-0,06 л/га	Минирующие мухи, совки, тли, плодоярки, долгоносики	
Горох*			
Соя*			
Нут*			

* – в стадии расширения регистрации на культуру

ПЕРИОД ЗАЩИТНОГО ДЕЙСТВИЯ

2-3 недели (в зависимости от погодных условий, сроков применения и вида вредителей).

СКОРОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Вредители прекращают питание сразу после обработки, гибель наступает в течение первых суток.

СОВМЕСТИМОСТЬ

Совместим в баковых смесях с большинством инсектицидов, фунгицидов и гербицидов, применяемых в те же сроки. Однако в каждом конкретном случае смешиваемые препараты рекомендуется проверять на совместимость.



Крестоцветная блоха
(*Phyllotreta cruciferae*)



Рапсовый цветоед
(*Brassicogethes aeneus* (Fabricius))



АРНИ



Действующее вещество:
тиаметоксам 180 г/л
бета-цифлутрин 60 г/л



Препаративная форма:
концентрат суспензии (КС)



Упаковка:
5 литров

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Активен в борьбе с насекомыми отрядов чешуекрылые (Lepidoptera), жесткокрылые (Coleoptera), двукрылыми (Diptera), полужесткокрылые (Hemiptera), равнокрылыми (Homoptera), бахромчатокрылые (Thysanoptera) и прочие.

Комбинированный инсектицид на основе двух различных химических классов, предназначен для борьбы с широким спектром вредителей сельскохозяйственных культур.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА

- Комбинация двух действующих веществ из разных классов усиливает эффективность препарата и снижает риск развития резистентности у вредителей. Тиаметоксам действует системно, поглощаясь растением и распространяясь по всем тканям, что защищает даже новые побеги. Бета-цифлутрин обеспечивает контактное и кишечное действие, мгновенно поражая насекомых.
- Сочетание действующих веществ уничтожает комплекс вредителей с/х культур, в том числе и скрытоживущих.
- Действие бета-цифлутрина обеспечивает моментальный паралич и гибель вредителей. Тиаметоксам обеспечивает продолжительную защиту (до 3-4 недель), благодаря своему системному действию.
- Экономическое решение: одна обработка комбинированным препаратом с длительным периодом защитного действия заменяет несколько обработок инсектицидами контактного действия.

ПЕРИОД ЗАЩИТНОГО ДЕЙСТВИЯ

2 – 4 недели (в зависимости от вида вредителя, фазы культуры и погодных условий).

СКОРОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ

В течение первого часа после применения.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Норма расхода	Вредный объект	Способ, время обработки
Пшеница яровая	0,09-0,11 л/га	Злаковые (гессенская, шведская) мухи, пшеничный трипс, злаковая тля, хлебные блошки, клоп вредная черепашка, серая зерновая совка	Опрыскивание в период вегетации.
Ячмень яровой		Хлебная пьявица, злаковые (шведская, гессенская) мухи, хлебные блошки	
Рапс	0,11-0,14 л/га	Крестоцветные блошки, капустная моль, белянки, рапсовый цветоед	
Подсолнечник	0,09-0,11 л/га	Луговой мотылек, тли	
Горчица	0,11-0,14 л/га	Крестоцветные блошки, капустная моль, белянки, рапсовый цветоед	



БИНГО



Действующее вещество:
бета-цифлутрин 125 г/л



Препаративная форма:
концентрат суспензии (КС)



Упаковка:
5 литров

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Инсектицид широкого спектра действия, активен в борьбе с вредителями отрядов чешуекрылых (Lepidoptera), жесткокрылых (Coleoptera), двукрылых (Diptera), полужесткокрылых (Hemiptera), равнокрылых (Homoptera) и прочих.

Современный контактно – кишечный инсектицид класса пиретроиды, для быстрого контроля широкого спектра вредителей сельскохозяйственных культур.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА

- Высокая эффективность против широкого спектра вредителей. Бета-цифлутрин действует на насекомых как контактный и кишечный инсектицид, что делает его эффективным против грызущих и сосущих вредителей.
- “Нокдаун эффект”- быстрое воздействие препарата вызывает паралич у насекомых, что значительно снижает уровень повреждения культур за короткий срок после обработки.
- Отличный компонент антирезистентной программы – применение нового действующего вещества позволяет избежать появления резистентности у вредителей.
- Минимальное проникновение в растение - как преимущество контактного вещества. Подходит для применения в тех случаях, когда нежелательно, чтобы инсектицид проникал в ткани растения, например, на культурах с коротким периодом до уборки урожая.
- Идеальный препарат для очаговой обработки - подходит для локализованной обработки зон, где вредители сконцентрированы, минимизируя расход препарата.

ПЕРИОД ЗАЩИТНОГО ДЕЙСТВИЯ

До 1-2 недели (в зависимости от погодных условий, сроков применения и вида вредителя).

СКОРОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ

В течение первого часа после попадания в организм насекомого.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Норма расхода	Вредный объект	Способ, время обработки
Пшеница яровая	40 - 60 мл/га	Злаковые (гессенская, шведская) мухи, пшеничный трипс, злаковая тля, хлебные блошки, клоп вредная черепашка, серая зерновая совка	Опрыскивание в период вегетации.
Ячмень яровой		Хлебная пьявица, злаковые (шведская, гессенская) мухи, хлебные блошки	
Лен		Луговой мотылек, тли	
Подсолнечник		Луговой мотылек, трипсы, блошки, плодоярки, совки	
Рапс Горчица	60 - 80 мл/га	Крестоцветные блошки, капустная моль, белянки, рапсовый цветоед	



ВЕКТОР



Действующее вещество:
хлорантранилипрол 110 г/л
лямбда-цигалотрин 55 г/л



Препаративная форма:
концентрат суспензии (КС)



Упаковка:
5 литров

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Инсектицид широкого спектра действия, активен в борьбе с комплексом вредителей из различных отрядов: чешуекрылыми (Lepidoptera), жесткокрылыми (Coleoptera), равнокрылыми (Homoptera), двукрылыми (Diptera) и др.

ПЕРИОД ЗАЩИТНОГО ДЕЙСТВИЯ

2 – 3 недели (в зависимости от вида вредителя и погодных условий)

СКОРОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ:

В течение первых часов после обработки вредители прекращают питание. Полная гибель наступает в течение нескольких часов после применения препарата.

12 часов после обработки: гибель гусениц капустной моли (разного возраста)

Высокоэффективный контактно-кишечный инсектицид широкого спектра действия с ярко выраженным овицидным эффектом.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА

- Сразу после обработки культуры у вредителя останавливается процесс питания, что обуславливает моментальный эффект от обработки.
- Направленное действие на опасный объект - капустная моль и др. вредителей.
- Контроль вредителей на всех стадиях развития: обладает овицидным действием, в отличие от многих других действующих веществ.
- Существенное снижение кратности химических обработок, что безусловно отражается на экономических показателях.
- Обладает широким спектром действия и уверенно может контролировать грызущих чешуекрылых, жесткокрылых и сосущих вредителей.
- Уникальный механизм действия, который исключает возникновение перекрестной резистентности. В разных погодных условиях способен проявлять высокую эффективность и пролонгированный контроль вредителей.





Кошение энтомологическим сачком в посевах рапса: комплекс вредителей



Рапсовый листоед (*Entomoscelis adonidis*): питание на листьях горчицы

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Норма расхода	Вредный объект	Способ, время обработки
Рапс	0,18 - 0,36 л/га	Крестоцветные блошки, капустная моль, белянки, рапсовый цветоед	Опрыскивание в период вегетации.
Горчица	0,18 - 0,36 л/га		



Гусеница капустной моли (*Plutella xylostella*): повреждения бутонов рапса



Гусеница капустной белянки (*Pieris brassicae*)



ГАНИМЕД



Действующее вещество:
Лямбда-цигалотрин 250 г/л



Препаративная форма:
концентрат эмульсии (КЭ)



Упаковка:
5 литров

Универсальный контактно-кишечный инсектицид из группы синтетических пиретроидов.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА

- Контроль широкого спектра вредителей основных сельскохозяйственных культур.
- Отсутствие остатков препарата в обрабатываемых культурах.
- Надежная защита против тлей.
- Низкий риск смыва.
- Быстрая скорость действия на вредителей (в течении 2-4 часов с момента обработки).

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Инсектицид широкого спектра действия, эффективен против чешуекрылых (Lepidoptera), равнокрылых (Homoptera), жесткокрылых (Coleoptera) и других вредителей.

ПЕРИОД ЗАЩИТНОГО ДЕЙСТВИЯ

От 5 до 15 дней в зависимости от вредителя и погодных условий.



Луговой мотылек
(*Loxostege sticticalis* L)



Лен: повреждения растений
льняным трипсом
(*Thrips linarius* Uzel)



Ганимед: результат защиты
растений от комплекса
вредителей

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Норма расхода	Вредный объект	Способ, время обработки
Пшеница яровая	0,04 л/га	Гессенская и шведская муха, пшеничный трипс, злаковые тли, хлебные блошки, вредная черепашка	Опрыскивание в период вегетации.
	0,03 л/га	Серая зерновая совка	
Ячмень яровой	0,04 л/га	Хлебная пьявица, гессенская и шведская муха, хлебные блошки	
Рапс яровой	0,04 л/га	Крестоцветные блошки, рапсовый цветоед, тли, белянки, клопы	
Чечевица	0,03 л/га	Тли, долгоносики	
Горох			



ГЕДЕОН ПРАЙМ



Действующее вещество:
лямбда-цигалотрин 142 г/л
тиаметоксам 257 г/л



Препаративная форма:
концентрат суспензии (КС)



Упаковка:
5 литров

Комбинированный инсектицид на основе двух действующих веществ из различных химических классов для борьбы с вредителями с/х культуры.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА

- Сочетание контактно-системных действующих веществ эффективно против широкого комплекса вредителей: как открыто, так и скрытоживущих.
- «Нокдаун-эффект» благодаря лямбда-цигалотрину: обладает контактным, кишечным и репеллентным действием. Насекомые перестают питаться уже через несколько часов после обработки.
- Пролонгированный период защитного действия за счет содержания системного действующего вещества - тиаметоксам.
- Устойчивая по длительности газовая фаза (репеллентность) и инсектицидная эффективность в сухую и жаркую погоду.

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

ГЕДЕОН ПРАЙМ инсектицид широко спектра действия, активен в борьбе с жесткокрылыми (Coleoptera), равнокрылыми (Homoptera), двукрылыми (Diptera), чешуекрылыми (Lepidoptera) и др.

ПЕРИОД ЗАЩИТНОГО ДЕЙСТВИЯ

2 – 3 недели (в зависимости от вида вредителя и погодных условий).

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Норма расхода	Вредный объект	Способ, время обработки
Пшеница яровая	0,08 - 0,1 л/га	Злаковые мухи (гессенская, шведская), пшеничный трипс, тля, хлебные блошки, клоп вредная черепашка, хлебные жуки, серая зерновая совка	Опрыскивание в период вегетации.
Ячмень яровой	0,08 - 0,1 л/га	Хлебная пядица, злаковые мухи, хлебные блошки	
Рапс яровой	0,08 - 0,1 л/га	Крестоцветные блошки, рапсовый цветоед, тли, белянки, луговой мотылек	
Картофель	0,08 л/га	Колорадский жук, тля	
Чечевица	0,08 - 0,1 л/га	Тли, клубеньковые долгоносики, луговой мотылек	
Лен масличный		Блошка, трипсы, луговой мотылек, люцерновая совка	
Сафлор		Долгоносик сафлорный, сафлорная муха	
Подсолнечник		Луговой мотылек, тли	



ДОБЕРМАН



Действующее вещество:
тиаметоксам 130 г/л
имidakлоприд 70 г/л
альфа-циперметрин 147 г/л



Препаративная форма:
концентрат суспензии (КС)



Упаковка:
5 литров



Флаговый лист яровой пшеницы:
питание нового поколения
хлебной полосатой блошки
(*Phyllotreta vittula*)



Нут: питание личинки нутового минера
(*Liriomyza cicerina*) внутри листа

Трехкомпонентный инсектицид на основе действующих веществ из различных химических классов, предназначенный для защиты зерновых, масличных и бобовых культур от комплекса вредителей, включая сосущих и скрытостеблевых.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА

- Длительный период защиты и высокая скорость воздействия за счёт уникальной комбинации трёх действующих веществ с разным механизмом действия.
- «Снимает» проблему скрытоживущих и труднодоступных (питающихся на нижней стороне листа) вредителей.
- Сохранение инсектицидной эффективности в сухую и жаркую погоду в широком диапазоне влажности и температуры воздуха.
- Тройное действие – контактное, кишечное и системное.
- «Нокдаун-эффект» благодаря альфа-циперметрину (обладает контактным, кишечным и репеллентным действием) – насекомые перестают питаться уже через несколько часов после обработки.

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Инсектицид широкого спектра действия, активен в борьбе с жесткокрылыми (Coleoptera), равнокрылыми (Homoptera), двукрылыми (Diptera), чешуекрылыми (Lepidoptera).

ПЕРИОД ЗАЩИТНОГО ДЕЙСТВИЯ

2 – 3 недели (в зависимости от вида вредителя и погодных условий).

СКОРОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ

В течение 1-2 часов после применения.



Горох: питание гороховой тли (*Acyrthosiphon pisum*) на стручке и листьях

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Норма расхода	Вредный объект	Способ, время обработки
Пшеница яровая	0,07 – 0,1 л/га	Злаковые мухи (гессенская, шведская), пшеничный трипс, тля, хлебные блошки, клоп вредная черепашка	Опрыскивание в период вегетации.
	0,07 л/га	Серая зерновая совка	
Ячмень яровой	0,07 л/га	Хлебная пьявица, злаковые мухи, хлебные блошки	
Рапс яровой	0,07 – 0,1 л/га	Крестоцветные блошки, рапсовый цветоед, тли, белянки, луговой мотылек	
Чечевица	0,07 – 0,1 л/га	Клубеньковые долгоносики, гороховая и люцерновая тля, луговой мотылек	
Горох	0,07 – 0,1 л/га	Клубеньковые долгоносики, гороховая и люцерновая тли, луговой мотылек	
Лен масличный	0,07 – 0,1 л/га	Блошка, трипсы, луговой мотылек, люцерновая совка	
Сафлор	0,07 – 0,1 л/га	Долгоносик сафлорный, сафлорная муха	
Подсолнечник	0,07 – 0,1 л/га	Луговой мотылек, тли	



ИМПЕРА



Действующее вещество:
эсфенвалерат 100 г/л



Препаративная форма:
концентрат эмульсии (КЭ)



Упаковка:
5 литров

Высокоэффективный инсектицид пиретроидной группы для борьбы с комплексом вредителей в посевах с/х культур.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА

- «Нокдаун-эффект» - высокая скорость инсектицидного воздействия на вредителя с момента обработки.
- Низкая норма расхода и экономичность обусловлена содержанием только одного наиболее биологически активного изомера (А-альфа).
- Двойной механизм действия – контактный и кишечный.
- Широкая инсектицидная и высокая летальная активность.

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

На зерновых культурах: активен в борьбе с клопом вредная черепашка (*Eurygaster integriceps*), злаковыми мухами (*Chloropidae*), пшеничным трипсом (*Haplothrips tritici*), хлебными блошками (*Chaetocnema* и *Phyllotreta*), пьявицей (*Oulema melanopus*), серой зерновой совкой (*Aramea anceps*) и др.

Рапс: крестоцветные блошки (*Phyllotreta*), рапсовый цветоед (*Meligethes aeneus*), белянки (*Pieris brassicae* L.), клопы, капустная моль (*Plutella maculipennis* Curt.)

Лен: трипсы (*Thrips linarius* Uz.), виды блошек (*Aphthona*).

Подсолнечник: луговой мотылек (*Loxostege sticticalis*), хлопковой совки (*Helicoverpa armigera*) и другими.

ПЕРИОД ЗАЩИТНОГО ДЕЙСТВИЯ

2-3 недели в зависимости от погодных условий, сроков применения и вида вредителя.

СКОРОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ

В течение первых часов после обработки вредители прекращают питание. Полная гибель наступает в течение нескольких часов после применения препарата.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Норма расхода	Вредный объект	Способ, время обработки
Пшеница яровая	0,1 – 0,13 л/га	Злаковые мухи, трипс, хлебные блошки, клоп вредная черепашка, серая зерновая совка	Опрыскивание в период вегетации.
Ячмень яровой		Хлебные блошки, злаковые мухи, хлебная пьявица	
Лен		Льняная блошка, льняной трипс Капустная моль*	
Рапс	0,2 – 0,3 л/га	Капустная моль, рапсовый цветоед, рапсовые блошки, белянки, клопы	
Подсолнечник	0,1 – 0,2 л/га	Хлопковая совка, луговой мотылек	



KORVUS



Действующее вещество:
альфа-циперметрин 300 г/л



Препаративная форма:
концентрат эмульсии (КЭ)



Упаковка:
5 литров

Концентрированный контактно-кишечный инсектицид из группы синтетических пиретроидов для быстрого контроля широкого спектра вредителей сельскохозяйственных культур.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА

- Быстрая скорость действия на вредителей (в течении 2-4 часов с момента обработки).
- Контроль широкого спектра вредителей основных сельскохозяйственных культур.
- Яркое выраженное овицидное действие и репеллентный эффект.
- Отсутствие остатков препарата в обрабатываемых культурах.
- Надежная защита против тлей.
- Низкий риск смыва препарата дождем.
- Отсутствие фитотоксичности на культуру в рекомендуемых дозировках.

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Инсектицид широкого спектра действия, эффективен против чешуекрылых (Lepidoptera), равнокрылых (Homoptera), жесткокрылых (Coleoptera) и других вредителей.

ПЕРИОД ЗАЩИТНОГО ДЕЙСТВИЯ

От 5 до 15 дней в зависимости от вредителя и погодных условий.

СКОРОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ

В течение первого часа после применения.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Норма расхода	Вредный объект	Способ, время обработки
Пшеница яровая	0,04-0,05 л/га	Клоп вредная черепашка, тли, гессенская, шведская, злаковые мухи, пшеничный трипс, хлебные блошки пьявицы, серая зерновая совка, хлебные жуки	Опрыскивание в период вегетации.
	0,07-0,1 л/га	Серая зерновая совка	
Ячмень яровой	0,04-0,05 л/га	Шведская муха, блошки, пьявицы, тли	
Рапс		Крестоцветные блошки, рапсовый пилильщик, листоед, рапсовый цветоед, рапсовый семенной скрытнохоботник, тли	
Горчица		Крестоцветные блошки, рапсовый цветоед, рапсовый листоед, тли	
Картофель		Колорадский жук	
Участки заселенные саранчовыми	0,05 л/га	Итальянский прус, азиатская и мароккская саранча, нестадные виды саранчовых	



ОРФЕЙ



Действующее вещество:
тиаметоксам 700 г/кг



Препаративная форма:
водно-диспергируемые гранулы
(ВДГ).



Упаковка:
500 грамм

Системный инсектицид пролонгированного контактно-кишечного действия против комплекса сосущих и грызущих вредителей.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА

- Эффективен против грызущих и сосущих вредителей посевов.
- Длительный период защитного действия.
- Эффективная защита семенных посевов от вирусов – высокая эффективность против тлей, являющихся переносчиками вирусов.
- Удобен в применении, логистике и хранении благодаря концентрированной форме.
- Низкий риск смыва препарата дождем.
- Отсутствие фитотоксичности на культуру в рекомендуемых дозировках препарата.
- Обладает дополнительным антистрессовым эффектом на культуру (повышает засухоустойчивость, устойчивость к перепадам температуры и т.д.)

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Препарат широкого спектра действия, эффективен против равнокрылых (Homoptera), жесткокрылых (Coleoptera), чешуекрылых (Lepidoptera) и других вредителей.

ПЕРИОД ЗАЩИТНОГО ДЕЙСТВИЯ

От 15 до 30 дней (в зависимости от погодных условий, сроков применения и вида вредителей).

СКОРОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Эффект наблюдается уже в первые часы после обработки.



Пшеничный трипс (*Haplothrips tritici*)

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Норма расхода	Вредный объект	Способ, время обработки
Пшеница яровая	30-40 г/га	Пшеничный трипс, серая зерновая совка (гусеницы младших возрастов)	Опрыскивание в период вегетации.
Ячмень яровой	30-40 г/га	Тли	
Картофель	25-30 г/га	Колорадский жук	
Рапс	40-50 г/га	Тли, крестоцветные блошки, семенной скрытнохоботник	
Горчица			



РЕЙВ



Действующее вещество:
альфа-циперметрин 100 г/л
дифлубензурон 120 г/л



Препаративная форма:
концентрат суспензии (КС)



Упаковка:
5 литров

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Инсектицид широкого спектра действия, эффективен против чешуекрылых (Lepidoptera), равнокрылых (Homoptera), жесткокрылых (Coleoptera) и других вредителей. Обладает усиленным ларвицидным и овицидным свойствами, которые проявляются в момент выхода личинки из яйца.

Комбинированный контактно-кишечный инсектицид для борьбы с широким спектром вредителей сельскохозяйственных культур.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА

- Быстрое начало действия с последующей длительной защитой от вредителей.
- Высокая эффективность на широкий спектр вредителей.
- Обладает ларвицидными и овицидными свойствами.
- Антрезистентная стратегия – два действующих вещества с разным механизмом действия.



Гусеницы лугового мотылька (*Loxostege sticticalis* L)

ПЕРИОД ЗАЩИТНОГО ДЕЙСТВИЯ

От 3 до 4 недель в зависимости от вида вредителя и погодных условий.

СКОРОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Биологический эффект наблюдается в течение первых часов после обработки. Благодаря наличию дифлубензурана биологический эффект препарата может длиться до 4 недель.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Норма расхода	Вредный объект	Способ, время обработки
Пшеница яровая	0,08-0,12 л/га	Блошки, трипсы, тли, клопы	Опрыскивание в период вегетации.
	0,06-0,08 л/га	Серая зерновая совка	
Ячмень яровой	0,08-0,12 л/га	Блошки, трипсы, тли, клопы	
Рапс	0,2-0,3 л/га	Капустная моль, белянки	



ТЕРРАНО



Действующее вещество:
бета-цифлутрин 90 г/л
имidakлоприд 210 г/л



Препаративная форма:
концентрат суспензии (КС)



Упаковка:
5 литров

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Активен в борьбе с жесткокрылыми (Coleoptera), равнокрылыми (Homoptera), двукрылыми (Diptera), чешуекрылыми (Lepidoptera).

ПЕРИОД ЗАЩИТНОГО ДЕЙСТВИЯ

2-3 недели (в зависимости от погодных условий, сроков применения и вида вредителей).

Двухкомпонентный инсектицид системного контактно-кишечного действия для защиты зерновых, масличных и бобовых культур.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА

- Идеальная комбинация двух действующих веществ из разных химических классов.
- Высокая биологическая активность против широкого спектра вредителей.
- Системные свойства позволяют контролировать труднодоступных и скрытно живущих вредителей.
- Отсутствие фитотоксичности на культуры.
- Соответствует требованиям антирезистентной стратегии.



Питание тли на чечевице

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Норма расхода	Вредный объект	Способ, время обработки
Пшеница яровая	0,05-0,06 л/га	Блошки, трипсы, серая зерновая совка, клоп вредная черепашка, скрытостеблевые вредители (гессенская и шведская мухи), хлебные жуки	Опрыскивание в период вегетации.
Картофель		Колорадский жук	
Рапс	0,05-0,12 л/га	Рапсовый цветоед, капустная белянка, луговой мотылек, рапсовый цветоед, капустная моль, тли, рапсовый пилильщик	
Чечевица, соя, горох*	0,05-0,06 л/га	Минирующие мухи, тли, совки, плодоярки, долгоносики	
Подсолнечник*		Луговой мотылек, долгоносики	

* – в стадии расширения регистрации на культуру и вредные объекты



ФЛЕЙМ



Действующее вещество:
альфа-циперметрин 117 г/л
тиаметоксам 147 г/л



Препаративная форма:
концентрат суспензии (КС)



Упаковка:
5 литров

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Инсектицид широкого спектра действия, эффективен против чешуекрылых (Lepidoptera), равнокрылых (Homoptera), полужесткокрылых (Hemiptera), двукрылых (Diptera), жесткокрылых (Coleoptera), прямокрылых (Orthoptera) и др.

СКОРОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Препарат начинает действие в течение первых часов после применения.

Комбинированный инсектицид на основе двух действующих веществ из различных химических классов, предназначенный для защиты зерновых, масличных и бобовых культур от комплекса листогрызущих и сосущих вредителей, включая скрытостеблевых.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА

- Комбинированный препарат с системным, контактным, кишечным, трансламинарным и репеллентным действием – позволяет провести качественную борьбу с вредителями, влияя на организм насекомого разными механизмами действия.
- «Нокдаун-эффект» – благодаря альфа-циперметрину (вредители прекращают питание после обработки в течении нескольких часов).
- Продолжительная защита культуры (благодаря пролонгированному действию тиаметоксама).
- Широкий спектр действия на вредителей различных классов.
- Борьба с резистентностью благодаря наличию двух действующих веществ с разным механизмом действия.
- Надежная защита: тиаметоксам сохраняет эффективность при высоких температурах, устойчив к солнечной инсоляции, сохраняет активность при низкой влажности, дождеустойчив.

ПЕРИОД ЗАЩИТНОГО ДЕЙСТВИЯ

До 2-3 недель в зависимости от вида вредителя и погодно-климатических условий.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Норма расхода	Вредный объект	Способ, время обработки
Пшеница яровая	0,1-0,15 л/га	Клоп вредная черепашка, тли, гессенская, шведская, злаковые мухи, пшеничный трипс, хлебные блошки, пьявицы, серая зерновая совка, хлебные жуки	Опрыскивание в период вегетации.
Ячмень яровой		Шведская муха, блошки, пьявицы, тли	
Рапс	0,1-0,25 л/га	Крестоцветные блошки, рапсовый пилильщик, листоед, рапсовый цветоед, рапсовый семенной скрытнохоботник, тли, луговой мотылек	
Картофель	0,15 л/га	Колорадский жук	
Горчица	0,1-0,25 л/га	Крестоцветные блошки, рапсовый цветоед, рапсовый листоед, тли	



ФОБОС



Действующее вещество:
альфа-циперметрин 200 г/л



Препаративная форма:
масляно-водный суспензионный
концентрат (МВСК)



Упаковка:
5 литров

Пиретроидный инсектицид, предназначен для защиты сельскохозяйственных культур от комплекса листогрызущих и сосущих вредителей.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА

- Защита широкого спектра культур от важнейших вредителей.
- Предотвращение потерь урожая.
- Высокая эффективность против вредителей в сочетании с низкой гектарной стоимостью.
- Эффективен против листогрызущих и сосущих вредителей.
- Гибель вредителей наблюдается в течении 2-4 часов с момента обработки.
- Продолжительный период защитного действия.
- Отсутствие фитотоксичности.
- Отсутствие остатков препарата в обрабатываемых культурах.



Лен: повреждение всходов льняной блошкой (*Aphthona flaviceps*)

ФОБОС применяется также для борьбы с нестадными видами саранчовых, может быть включен в программы интегрированной защиты сельскохозяйственных культур.

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Инсектицид широкого спектра действия, активен в борьбе с жесткокрылыми (Coleoptera), равнокрылыми (Homoptera), чешуекрылыми (Lepidoptera) и другими вредителями.

ПЕРИОД ЗАЩИТНОГО ДЕЙСТВИЯ

1-3 недели (в зависимости от погодных условий, сроков применения и вида вредителей). Скорость воздействия: гибель вредителей наблюдается менее чем в течении 2-4 часов с момента обработки (в зависимости от климатических условий, вида и физиологического состояния вредителя).

СКОРОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ

ФОБОС обладает выраженным «нокдаун-эффектом». Гибель наступает спустя 30 минут и до 2-3 часов после обработки (в зависимости от климатических условий, вида и физиологического состояния вредителя).



Пшеница: повреждения листовой поверхности саранчой

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Норма расхода	Вредный объект	Способ, время обработки
Пшеница яровая	0,05-0,075 л/га	Вредная черепашка	Опрыскивание в период вегетации.
	0,05 л/га	Тли, цикадки, трипсы, пьявицы	
	0,1-0,15 л/га	Серая зерновая совка	
	0,06-0,075 л/га	Гессенская муха, хлебные жуки	
Рапс	0,05-0,075 л/га	Рапсовый цветоед, крестоцветные блошки, тли, капустная белянка, скрытнохоботник	
Саранчовые	0,075 л/га	Итальянский прус, марокская, азиатская саранча, виды нестадных саранчовых	
Яровой ячмень*	0,05-0,075 л/га	Пьявица, хлебные блошки, злаковые мухи	
Чечевица, горох, соя*	0,05-0,1 л/га	Тля гороховая, долгоносики, подгрызающие совки	
Лён масличный*	0,05-0,1 л/га	Льняной трипс, люцерновая совка, совка-гамма, луговой мотылек, льняные блошки, льняная плодоярка	
Подсолнечник*	0,05-0,1 л/га	Луговой мотылек, долгоносики	
Картофель	0,05 л/га	Колорадский жук	
Хлопчатник	0,15 л/га	Хлопковая совка	

* – в стадии расширения регистрации на культуру



ЗВЕЛИН



Действующее вещество:
абамектин 90 г/л
тиаметоксам 270 г/л



Препаративная форма:
концентрат суспензии (КС)



Упаковка:
5 литров

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Эффективно подавляет все питающиеся стадии клещей и насекомых-вредителей из разных отрядов: жесткокрылые (Coleoptera), двукрылые (Diptera), чешуекрылые (Lepidoptera), равнокрылые (Homoptera), тли (Aphididae), полужесткокрылые (Hemiptera) и др.

ПЕРИОД ЗАЩИТНОГО ДЕЙСТВИЯ

2 – 3 недели (в зависимости от вида вредителя и погодных условий).

СКОРОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Поражение вредителей наступает в течение нескольких часов после обработки.

Инсектоакарицид контактно-кишечного действия для защиты с/х культур от широкого спектра вредителей.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА

- Главное свойство препарата – борьба с клещами в посевах с/х культур.
- Абамектин обладает нейротоксичным действием - ингибирует передачу нервного импульса и вызывает паралич у насекомых и клещей.
- Обладает длительным кишечным действием и высокой трансламинарной активностью – уже через 1,5-2 часа полностью способен проникнуть в растение.
- Эффективен против клещей, трипсов и минирующих насекомых, резистентных к другим акарицидам, отлично подходит как антирезистентный партнёр.
- Не оказывает фитотоксичного действия на растения.
- Эффективность независимо от внешних условий (сохраняет активность при высоких температурах, низкой влажности, устойчив к инсоляции, дождеустойчив).



Симптомы повреждения флагового листа яровой пшеницы растительноядными клещами

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Норма расхода	Вредный объект	Способ, время обработки
Пшеница яровая	0,1-0,12 л/га	Пшеничный клещ, пшеничный трипс, хлебные блошки, клоп вредная черепашка, гессенская муха, серая зерновая совка	Опрыскивание в период вегетации
Ячмень яровой		Пшеничный клещ, трипсы, блошки, шведская муха, пьявица	
Хлопчатник		Паутинный клещ, тли	
Соя			



Высокоэффективный контактно-кишечный инсектицид широкого спектра действия с ярко выраженными овицидными свойствами.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА

- Высокая биологическая активность против широкого спектра вредителей.
- Ярко выраженные овицидные свойства на чешуекрылых.
- Отсутствие фитотоксичности на культуры.
- Увеличение эффективности при повышенных температурах.
- Соответствует требованиям антирезистентной стратегии.

СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Инсектицид эффективно действует на личинки чешуекрылых всех возрастов, не контролируя взрослых насекомых. Он также проявляет активность против некоторых сосущих вредных насекомых, например, цикадок, клопов, представителей жесткокрылых и двукрылых.

ПЕРИОД ЗАЩИТНОГО ДЕЙСТВИЯ

Элистер обладает длительным периодом защитного действия 10-14 дней в зависимости от интенсивности заселения культуры вредителями. Индоксакарб долго сохраняется на листе, практически не смывается дождем, поэтому долго сохраняет защитные свойства (3-4 недели). Эффективен против листогрызущих насекомых, но неэффективен против сосущих, т.к. не проникает в ткани листа.

СКОРОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ

В результате контакта с инсектицидом происходит ускоренная остановка питания у насекомых. Вредители теряют активность, подвижность, падают с растений, либо находятся на нём не нанося вред. В течение 1-2 суток погибают. В течение 10-14 дней после обработки Элистер сохраняет защитный период.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Норма расхода	Вредный объект	Способ, время обработки
Лён масличный	0,2-0,3 л/га	Луговой мотылек, льняная плодоярка-листовертка, совка-гамма	Опрыскивание в период вегетации.
Чечевица		Капустная моль, капустная белянка, рапсовый цветоед	
Горчица, рапс	0,15-0,2 л/га	Крестоцветные блошки	
Яровая пшеница		0,07-0,1 л/га	
Хлопчатник	0,2-0,4 л/га	Хлопковая совка (гусеницы младших возрастов)	
Кукуруза	0,17-0,25 л/га	Хлопковая совка	



СПОРТАК



Действующее вещество:
Дикват 300 г/л



Препаративная форма:
водный раствор (ВР)



Упаковка:
20 литров

Универсальный препарат контактного действия, применяемый для предуборочной десикации посевов льна, рапса, подсолнечника, зерновых и бобовых культур, а также одновременного уничтожения однолетних и многолетних злаковых и двудольных сорняков на поле.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА

- Универсальность применения – может использоваться в технологии производства как десикант и как гербицид контактного действия.
- Отличная дождестойкость.
- Эффект десикации проявляется через 4-6 дней после обработки.
- Не имеет ограничений по севообороту. Период полураспада составляет менее 1 недели.
- Очень высокая и быстро проявляющаяся гербицидная активность как против злаковых, так и против двудольных сорняков.

ПЕРИОД ЗАЩИТНОГО ДЕЙСТВИЯ

Препарат применяют в период физиологической спелости семян (влажность семян 30-50% в зависимости от культуры, которая обрабатывается). Обработка в более ранние сроки развития культурных растений может произвести к снижению урожайности и снижению посевных качеств семян. Обязательным условием эффективного действия препарата является наличие активно-действующих зеленых клеток растения.

СКОРОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Первые визуальные симптомы действия препарата на растения появляются на следующий день в виде обесцвечивания листьев; бурых пятен и некрозов на 2-3 день. Через 6-7 дней после внесения препарата можно приступать к уборке урожая.


РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Культура	Норма расхода	Сроки применения	Способ, время обработки
Пшеница яровая	0,75-1,0 л/га	Десикация культуры, однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание в фазе начала восковой спелости зерна
Подсолнечник	1,0 л/га		Опрыскивание посевов в начале побурения корзинок
Лён масличный*			Опрыскивание в фазе начала раннежелтой спелости (количество зеленых семян 25%)
Чечевица*			Опрыскивание в фазе побурения бобов нижнего и среднего ярусов
Рапс*			Опрыскивание в фазе начала естественного созревания при побурении 70-75% стручков и влажности семян 25-35%
Картофель*			Опрыскивание в период окончания формирования клубней и огрубления кожуры

* – в стадии расширения регистрации

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Использовать препараты, разрешенные к применению.
2. Хранить пестициды в закрытом помещении, предназначенном для хранения ХСЗР.
3. Прочитать тарную этикетку, обращая внимание на регламенты применения и меры безопасности.
4. Всегда использовать средства индивидуальной защиты: спецодежду, защитные перчатки, защитные очки, респиратор, защитную обувь.
5. Используемую технику регулярно осматривать, проверять исправность и, при необходимости, настраивать.
6. Работать аккуратно, избегая утечки или просыпания препаратов. В случае утечки или просыпания очистить место загрязнения для минимизации неблагоприятного воздействия на окружающую среду.
7. При опорожнении канистры, держать канистру двумя руками с таким наклоном, чтобы воздух беспрепятственно поступал в канистру, избегать сильного наклона канистры, чтобы предотвратить разбрызгивание препарата.
8. При приготовлении баковой смеси, следовать рекомендациям на этикетках применяемых препаратов, тщательно растворять каждый из препаратов перед добавлением следующего.
9. Трижды промыть пустую тару, сливая воду после промывки в бак с рабочим раствором.
10. Проткнуть пустую и вымытую канистру, чтобы предотвратить повторное использование для бытовых нужд.
11. Собрать пустые, вымытые и пробитые канистры для утилизации или переработки.
12. Помыть руки, не снимая перчатки, снять средства индивидуальной защиты.
13. Принять душ, подготовить средства индивидуальной защиты к последующему использованию.





Протравливание и посев.

1. Для протравливания использовать только препараты, зарегистрированные для соответствующего применения.
2. Не следует допускать к протравленным семенам посторонних лиц, детей и домашних животных. Протравленные семена нельзя использовать в пищу или на корм животных.
3. При протравливании в хозяйстве, необходимо проводить тщательную очистку семян, предназначенных для протравливания, чтобы повысить качество протравливания и снизить попадание пыли на персонал, оборудование и в окружающую среду.
4. При использовании закупленных протравленных семян, прочитать этикетку и соблюдать указанные требования.
5. Избегать выброса пыли при открытии мешка с протравленными семенами, не прикладывать давление к не полностью открытому мешку.
6. Аккуратно заполнять бункер сеялки, позволяя семенам самостоятельно высыпаться из наклоненного мешка. Не переворачивать мешок, не пересыпать в сеялку пыль со дна мешка.
7. Во время протравливания семян и очистки оборудования использовать средства индивидуальной защиты. Не брать обработанные семена голыми руками.
8. При использовании пневматических вакуумных сеялок, отводить пыль от протравленных семян к поверхности почвы.
9. Соблюдать глубину высева, при необходимости, присыпать протравленные семена, попавшие на поверхность, во избежание гибели птиц и млекопитающих.
10. Не проводить посев при сильном ветре, соблюдать скоростной режим и рекомендованную норму высева.
11. Избегать просыпания семян. Высыпавшиеся обработанные семена собирать в мешки из-под семян и отложить для последующей утилизации. Не оставлять просыпавшиеся семена в поле.
12. После окончания сева удалить оставшиеся семена из бункера сеялки в мешки из под семян, тщательно очистить сеялку.

РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ НА ПОЛЕ

Для обеспечения качества обработок и получения высокого эффекта необходимо соблюдать следующие параметры:

Скорость ветра. Скорость ветра при внесении пестицидов не должна превышать 5 м/сек при наземном опрыскивании и 3-4 м/сек при авиаобработке.

Не следует проводить обработки, особенно авиа, при ветре неустойчивого направления. В этом случае снос препарата может быть в любую сторону, что может привести к повреждению чувствительных культур.

Температурный режим. Температура воздуха при обработках не должна превышать +25° С, так как с ее повышением резко увеличивается испаряемость рабочей жидкости и снижается эффективность.

Влажность воздуха должна быть не ниже 40 %. В случае применения препаратов в условиях низкой влажности воздуха рекомендуется добавлять дополнительные ПАВы, антииспарители.

Наилучшее время опрыскивания – от 5 до 10 часов утром и от 17 до 22 часов вечером, когда атмосферный воздух стабилен (отсутствие температурной инверсии).



ПОРЯДОК ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ

Рабочий раствор гербицида готовят непосредственно перед опрыскиванием и заправку им опрыскивателя производят на специальных заправочных площадках, которые в дальнейшем подвергаются обеззараживанию.

Препараты следует загружать согласно регламентам их применения либо в виде маточных растворов, либо в исходном виде через смеситель (предбак) или непосредственно в бак.

Прежде чем добавлять жидкие препараты в бак, их необходимо тщательно перемешать в заводской упаковке (встряхнуть канистру несколько раз).

Далее рабочий раствор готовят следующим образом: бак опрыскивателя наполняют примерно наполовину во-

дой, добавляют в него необходимое количество гербицида, доливают воду до полного объема и перемешивают рабочую жидкость гидравлическими мешалками.

В случае применения баковой смеси препаратов поступают следующим образом:

- Перед заправкой опрыскивателя отмеряют требуемое количество препаратов на одну заправку опрыскивателя.
- Бак опрыскивателя в начале приготовления баковой смеси должен быть заполнен водой не меньше, чем наполовину, а лучше на две трети, чтобы избежать возможного избыточного пенообразования.

ПОРЯДОК ОЧЕРЕДНОСТИ ЗАГРУЗКИ ПРЕПАРАТОВ

Порядок очередности загрузки и смешивания зависит от препаративной формы препарата и при приготовлении баковой смеси он следующий:

1. Сначала добавляют сухие препараты на основе препаративных форм: СП (смачивающий порошок), ВДГ (водно-диспергируемые гранулы), СТС (сухая текучая суспензия), ВГ (водорастворимые гранулы).
2. Затем идут препараты на основе: КС (концентрат суспензий), КЭ (концентрат эмульсий).
3. Следующие добавляют препараты с препаративными формами на основе масел: МД (масляная дисперсия), ЭМВ (эмульсия масляно-водная), МВСК (масляно-водный суспензионный концентрат).
4. Затем идут препараты на основе: водных растворов: ВР, ВРК, ВГР.
5. Затем в конце добавляют ПАВ (поверхностно активные вещества) напрямую в бак (не через предбак), чтобы избежать повышенного пенообразования.
6. И в самом конце добавляются удобрения и микроудобрения.

После добавления всех компонентов баковой смеси доливают в бак воду до полного объема.

В случае отсутствия информации по смешиванию конкретных препаратов (а также микроудобрений, адъювантов и пр.), рекомендуется предварительно проверить препараты на физико-химическую совместимость.

Гидросмеситель так же должна продолжать работать и во время опрыскивания для поддержания однородности рабочего раствора.

ОЧИСТКА ОПРЫСКИВАТЕЛЯ

В связи с тем, что даже малые количества препарата (особенно гербицида) могут причинить значительный ущерб некоторым чувствительным культурам (сахарная свекла, рапс, подсолнечник, овощи и т.д.), то необходимо после завершения работ тщательно промыть оборудование для опрыскивания, особенно перед использованием его на других культурах. Очистку опрыскивателей рекомендуется проводить непосредственно в поле сразу после завершения работ.

Порядок очистки опрыскивателя

1. Опорожнить бак опрыскивателя.
2. Проверить и очистить распылители и фильтры: напорной магистрали всасывающей магистрали, давления, распылителей. Особенно важен фильтр всасывания!
3. Не забыть промыть предварительный смеситель (предбак)!
4. Заполнить бак на 20 – 30 % объема чистой водой, тщательно промыть стенки внутри бака и шланги (рукава). Использованную воду вылить на обработанное поле.
5. Повторить процедуру очистки два раза.

ВАЖНО!

Гидромешалка в бочке должна работать во время добавления всех компонентов, причем после введения каждого нового препарата необходимо добиваться его полного растворения, прежде чем добавить следующий.

